

med.
iss.

(26.)

m e



Inaugural-Dissertation

der

medizinischen Facultät zu Gießen

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe,

vorgelegt von

Emil Sames

aus Gießen.

Präses : Herr Professor Dr. Wilbrand.




Gießen, 1860.

Druck von Wilhelm Keller.

Handwritten title (mirrored bleed-through): *Handwritten title*

Handwritten text (mirrored bleed-through): *Handwritten text*

Handwritten text (mirrored bleed-through): *Handwritten text*



Handwritten text (mirrored bleed-through): *Handwritten text*

Handwritten text (mirrored bleed-through): *Handwritten text*

Herr
Bemü
diese
wärn

Meinem hochverehrten Lehrer und Präses,
Herrn Professor Dr. Wilbrand, sage ich für
Bemühungen und freundliche Unterstützung bei
dieser meiner Abhandlung hiermit öffentlich den
wärmsten Dank.

Emil Sames.

Meinem hochverehrten Lehrer und
Herrn Professor Dr. Wilbrand, sage ich
Betreffungen und freundliche Unterstützung
dieser meiner Abhandlung hiermit öffentlich
vielmalen Dank.

Heinrich Schumacher

L
Frage
die si
muth
mache
Schrift
zu G
mens
sucht
folgen
mensc
fragm
Orfi
Köll
Holl
weber
schwe
1857)
Sch
knoc
schri
ter F

Da es in gerichtlich-medizinischer Hinsicht für viele Fragen von größtem Werthe ist, nach den Erscheinungen, die sich an den Knochen darbieten, Rückschlüsse auf das authmafsliche Lebensalter des betreffenden Individuums machen zu können, so habe ich das in verschiedenen Schriften sich findende Material, so weit mir ein solches zu Gebote stand, zu sammeln und in eine das ganze menschliche Leben umfassende Uebersicht zu bringen versucht. Die von mir vorzugsweise benutzten Bücher sind folgende : Nicolai's Beschreibung der Knochen des menschlichen Fötus (Münster, 1829); v. Ritgen's Probe-fragment einer Physiologie des Menschen (Kassel, 1832); Orfila's gerichtliche Medicin (I. Bd., Leipzig, 1848); Kölliker's mikroskopische Anatomie (Leipzig, 1852); Hollstein's Anatomie (Berlin, 1852); Gerlach's Gewebelehre (Mainz, 1853); Valentin's Physiologie (Braunschweig, 1855); Böcker's gerichtliche Medicin (Iserlohn, 1857); Bruck's Zahnheilkunde (Berlin, 1856), Fr. A. Schwegel, über die Gelenkverbindung der Beckenknochen und deren Verhalten bei der Geburt (Monatschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten, dreizehnter Band, 2. Heft; Berlin, 1859).

Nicolai beträgt die Höhe des Skeletts 8—9“; die Höhe des Kopfes vom Foramen occipitale zum höchsten Punkte des Scheitels 3—4“; die Breite des Schädels vom vordersten Theile des Scheitelbeines der einen bis zur anderen Seite 2—2½“; die Länge des Schädelns der Pars nasal. oss. frontis zum Höcker des Hauptbeins 2—3“; die Länge des Stammes vom Halswirbel bis zum Steißbeine 3¾—4“; die Länge der Gliedmaßen 1—1¾“. Die unteren Gliedmaßen kaum hervor.

Man werden immer nur die Knochen in den einzelnen Stadien aufgezeichnet werden, welche Verknöcherungen zeigen, und ist somit mit ihrer Aufstellung, um beständiger Wiederholung zu ersparen, schon der Begriff der „Verknöcherung“ verbunden.

Wirbeln: Ein runder netzförmiger Knochenpunkt (Nicolai, v. Ritgen, Orfila). Nach Kölliker am Ende des zweiten oder am Anfang des dritten Monats. In Hollstein im zweiten Monate und zwar etwas kleiner als in den Wirbeln. — Höhe = 1½“, Breite = 1“ (Nicolai).

Scheitelbeine: Aus mehreren Knochenpünktchen zusammengesetzte Blättchen und am Ende des Monats strahlige Ossification (Nicolai, v. Ritgen). Nach Hollstein in der 7—8. Woche Anfang der Verknöcherung.

zeitig in
stein.
Obe
nach N
nach B
Nach K
Breite 2
Wo
v. Rit
45. Tag
v. Rit
Na
stein.
Un
die Ve
aller S
2“ lan
Sc
Länge
Nach
T
Wirbe
P
Holl
W
in der

stein.

Oberkiefer : Ein dreieckiger weißer Knochenpunkt nach Nicolai. — Am 30. Tage Verknöcherungs-Anfang nach Beclard, noch vor dem der Wirbel nach Hollstein. Nach Kölliker ebenfalls in diesem Monate. Höhe $1\frac{1}{2}''$, Breite $\frac{2}{3}''$ nach Nicolai.

Wangenbein : Ossification in demselben nach Nicolai, v. Ritgen und Hollstein. Nach Beclard vor dem 45. Tage. Länge $1-1\frac{1}{2}''$, Breite $\frac{1}{4}-\frac{3}{4}''$ (Nicolai, v. Ritgen).

Nasenbeine : In diesem Monate nach Beclard, Hollstein.

Unterkiefer : Die Schlüsselbeine ausgenommen tritt die Verknöcherung des Unterkiefers nach den Angaben aller Schriftsteller am frühesten ein. Jede Hälfte $1\frac{3}{4}''-2''$ lang, Höhe vorn $\frac{1}{4}''$ nach Nicolai, v. Ritgen.

Schlüsselbein : Ein Kern in der äußeren Extremität. Länge $1-1\frac{1}{2}''$, Breite und Höhe $\frac{1}{3}''$ (Nicolai). — Nach Meckel schon $3''$ lang um die Mitte des Monats.

Thränenbein : Nach Hollstein später als in den Wirbeln.

Pflugscharbein : Nach Beclard am 45. Tage, nach Hollstein zu gleicher Zeit, wie in den Wirbeln.

Wirbel : Anfang der Verknöcherung nach Kölliker; in den Bogenhälften früher als im Körper (Hollstein);

Wirbeln.

Oberarmbein : In der 5. Woche und zwar in der
nach v. Ritgen, Hollstein; nach Kölliker
Ossification in diesem Monate. Länge 1'', Dicke
nach Nicolai.

Elle und Speiche : Beide ziemlich zu gleicher Zeit
v. Ritgen, Nicolai, Orfila, Kölliker, Holl-

Mittelhandknochen : Hier will Beclard Spuren der
Verknöcherung beobachtet haben und zwar in der 7. Woche.

Phalangen der Hand : Was die erste Reihe anlangt,
t man nach v. Ritgen in dem entsprechenden des
Fingers einen Knochenpunct in der 7. Woche, in der
dem des Zeigefingers. Nach Beclard ein Knochen-
um die 6. Woche in der ersten und dritten Reihe.

Becken : Die Verknöcherung beginnt etwas später als
in Wirbeln nach Hollstein, und zwar zuerst im
Bein, dann im Sitzbein, zuletzt im Schambein; und
geht die Verknöcherung vom Körper derselben aus.

Beclard beginnt die Verknöcherung des Hüftbeins
in der 7. Woche; nach Orfila die des Os ilium ebenfalls
in diesem Monate. Das Kreuzbein zeigt Verknöcherung
nach Hollstein in der 8—9. Woche des Fötallebens.

Oberschenkelbein : Nach Nesbitt und Meyer in der
Woche, sogar am 28. Tage nach Beclard, in der

liker gibt ebenfalls diesen Monat an.

Mittelfußknochen : Der Knochenkern für das Mittelstück erscheint fast gleichzeitig mit dem in den Wirbeln nach Hollstein.

Phalangen : Fast gleichzeitig mit den Mittelfußknochen und von der Mitte beginnend, am frühesten in der grossen Zehe (Hollstein).

Von den übrigen hier nicht angeführten Knochen des Skeletts ist in diesem Monate Nichts als die knorpelige Grundlage zu bemerken.

Dritter Monat.

Die Höhe des Skeletts 31—33″, Höhe des Kopfes 6—7″, Breite des Schädels 7—7½″, Länge des Schädels 8—9″, Länge des Stammes 14—16″, Länge der oberen Gliedmassen 8—11″, Länge der unteren Gliedmassen 6—8″ (Nicolai).

Stirnbein : Verknöcherung strahlenförmig, am Margo supraorbitalis am stärksten (Nicolai, v. Ritgen). Am Ende des zweiten und Anfang des dritten Monats (Köl liker). — Höhe 3″, Breite 3—3½″ (Nicolai). — Höhe 3″, Breite 2½″ nach v. Ritgen.

Scheitelbeine : Ossification strahlenförmig (Nicolai, v. Ritgen). — Höhe 5—6″, Breite 3—4″. Am Ende

1 1 $\frac{1}{2}$ ''' lang, 1''' breit (v. Ritgen).

Keilbein : Drei Knochenpunkte und zwar zwei für die *Ala magna* und einen vor dem Zapfentheile des Hinterbeines nach Nicolai. — Am Ende des Monats ist das Keilbein aus 6 getrennten Knochenstücken (v. Ritgen). Die Höhe der *Ala magna* 4—5''' nach Nicolai.

Fläfenbeine : Die Strahlung an der Schuppe, sowie der *Foramen* werden deutlich. Ein Knochenkern für die *Partes petrosa* und *Pars mastoidea* (Nicolai, v. Ritgen). *Process. zygomatici* 1 $\frac{1}{2}$ ''' lang. *Pars squamosa* 1''' hoch, 1''' breit (Nicolai). — Schuppe 1 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch, 2 Zoll breit (v. Ritgen).

Unterkiefer : Spuren von Alveolen (Nicolai, Orfila). Nicolai fand deren nicht. Am Ende des zweiten Monats Verknöcherung nach Meckel. *Proc. zygomatici* wird deutlich nach Nicolai. Die verschiedenen Theile zeigen mehr oder weniger Verknöcherung; die Knorpelplatten der Gaumengegend noch ohne alle Knochen Spuren (v. Ritgen). Höhe 1 $\frac{3}{4}$ —2''' (Nicolai).

Augenbein : Höhe 1 $\frac{1}{2}$ '''—1 $\frac{3}{4}$ ''' (Nicolai, v. Ritgen).

Nasenbeine : Ein Knochenkern am Anfang des dritten Monats nach Meckel. — Undeutlich als runde Knochenkerne sichtbar (Nicolai).

5''' lang, Höhe 1'', Breite des Knochens gegen $\frac{1}{2}$ '' , der Gelenktheil ist $1\frac{1}{4}$ ''' lang (v. Ritgen).

1. *Halswirbel* : Die Seitentheile sind $\frac{1}{2}$ ''' lang, $\frac{1}{4}$ ''' hoch (Nicolai).

2. *Halswirbel* : Länge der Seitentheile $\frac{1}{2}$ ''' (Nicolai).

Die 5 letzten Halswirbel : Seitentheile $\frac{1}{2}$ ''' lang, $\frac{1}{4}$ ''' hoch (Nicolai).

Rückenwirbel : Körper $\frac{1}{4}$ ''' hoch (Nicolai).

Lendenwirbel : In Körpern und Seitentheilen weisse Knochenpunkte (Nicolai).

Kreutzbein : Zuweilen in der neunten Woche Verknöcherungsanfang (Hollstein).

Schlüsselbein : 3''' lang (Nicolai); $3\frac{1}{2}$ ''' lang, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ''' breit (v. Ritgen).

Schulterblatt : In der Nähe des oberen Randes erhebt sich am Ende des Monats die Gräthe (Nicolai, v. Ritgen). — Verknöcherung am Ende des zweiten und Anfang des dritten Monats (Kölliker). — 1—2''' lang, $1\frac{1}{2}$ ''' breit nach Nicolai; $1\frac{1}{2}$ —2''' lang, $\frac{3}{4}$ — $6\frac{1}{2}$ ''' breit nach v. Ritgen.

Oberarmbein : $3\frac{1}{2}$ ''' lang, $\frac{1}{2}$ ''' breit und dick nach Nicolai.

Vorderarm : Zuweilen erst in diesem Monat Verknöcherung nach Kölliker. — *Ellenbogen* 3''' lang nach

ige- und Mittelfingers 1 Knochenpunkt; b) zweite
keine Verknöcherung; c) dritte Reihe : Undeut-
und unregelmäßige Knochenpünktchen nach Nicolai;
ersten Reihe Daumen- und Ohrfinger $1-1\frac{1}{2}'''$ lang,
zweiten Reihe Beginn der Verknöcherung und
lang, in der dritten Reihe sehr deutlich nach-
gen. — Verknöcherung der Phalangen nach Köll-
— In den zweiten Gliedern etwas später nach-
stein.

ste Rippe : $1\frac{1}{2}-2'''$ lang, $1\frac{1}{4}'''$ dick (Nicolai).
dieser bis zur siebenten Rippe nehmen die Knochen
se zu.

bente Rippe : $4-5'''$ lang, $\frac{3}{4}'''$ hoch (Nicolai,
gen). Von dieser bis zur letzten nehmen die
an Länge und Krümmung ab.

tzte Rippe : $1\frac{1}{2}'''$ lang nach Nicolai.

armbein : Höhe des Knochenkerns $\frac{3}{4}-1'''$, Breite $\frac{1}{2}'''$
lai); nach v. Ritgen : größte Breite $3'''$, geringste
in der Gegend des Halses $1\frac{1}{4}'''$, größte Höhe $2\frac{1}{2}'''$,
öfste Durchmesser des verknöcherten beilförmigen
s $1\frac{3}{4}'''$.

zbein : Verknöcherung nach Orfila u. v. Ritgen,
letzterem in der neunten Woche $\frac{2}{3}'''$ lang und $\frac{1}{6}'''$
n der zehnten Woche $\frac{1}{4}'''$ hoch, in der zwölften
 $1\frac{1}{4}'''$ hoch und der aufsteigende Ast $\frac{3}{4}'''$ hoch,

$\frac{1}{6}$ ''' dick, der dritten und vierten ebenso, der fünften $\frac{2}{3}$ ''' lang, $\frac{1}{6}$ ''' dick. Nach Nicolai: 5 längliche, ungefähr 2''' lange Knochen.

Phalangen des Fusses: Verknöcherungen in denselben nach Kölliker, ohne weitere Angaben. Nach v. Ritgen in der zwölften Woche Anfang der Verknöcherung im ersten Phalanx der grossen Zehe, und in den letzten Gliedern sämtlich knöcherne Spitzen. Nach Nicolai keine Verknöcherung.

Vierter Monat.

Höhe des Skeletts $5\frac{1}{2}$ —6 Zoll. Höhe des Kopfes 15—17'', Breite des Schädels 18—19'', Länge des Schädels 19—21'', Länge des Stammes 2— $2\frac{3}{4}$ Zoll, Länge der oberen Gliedmassen 2— $2\frac{1}{4}$ Zoll, Länge der unteren Gliedmassen $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ Zoll (Nicolai).

Stirnbein: Die Pars orbitalis weicht deutlich nach hinten vom Stirnstück ab, letzteres 3mal gröfser als ersteres; Augenhöhlenbogen springt scharf vor, seine hintere Spitze legt sich an das Jochbein. Die inneren Ränder der Stirnbeine berühren sich unten beinahe und verbinden sich mit den Nasenbeinen. Höhe 10—11'', Breite 8—9'' (Nicolai, v. Ritgen).

der Gelenkfortsatz nach innen und vorn laufend.
basilaris hinten mit 2 stumpfen Spitzen, welche die
e Grenze des Hinterhauptsloches zwischen sich fas-
Nicolai, v. Ritgen). Höhe der Pars occipitalis
e 1", Breite 8—10" (Nicolai, v. Ritgen). Zapfen-
4" lang nach v. Ritgen.

schläfenbein : Nach Meckel entsteht der knöcherne
g dieses Knochens erst in diesem Monat. Pars squa-
deutlich. Felsentheil kegelförmig. Am Ende des
s ist der Annulus kreisförmig, nach v. Ritgen bis
geschlossen. Pars mastoidea von der Gröfse einer

Gehörknöchelchen zu sehen (Nicolai, v. Ritgen).
Orfila u. Kölliker ebenfalls Gehörknöchelchen
den. Höhe der Schuppe $2\frac{1}{2}$ ". — Pars squamosa
hoch und 4—5" breit. Process. zygomat. $2-2\frac{1}{2}$ "
Pars petrosa 3— $3\frac{1}{2}$ " lang, $1-1\frac{1}{2}$ " breit, Kreis-
des Annulus 4".

eilbein : Unten am Körper die Process. pterygoidei;
agna über das Jochbein hervorragend mit 3 Flächen
lai); das 5.—6. Paar Knochenkerne kommen jetzt
(v. Ritgen). Ala magna 7—8" hoch, Process.
oidei 2" lang (Nicolai, v. Ritgen).

berkiefer : Man bemerkt Nasenausschnitt, einige
n, Berührung des Pr. zygomat. mit dem Jochbeine
lai, v. Ritgen). Vordere Spitzen bilden Spin.

Zwischenkieferbeine : fadenförmige Knochen (Nicolai). Jeder dieser Knochen $1\frac{1}{2}'''$ lang (v. Ritgen).

Pflugscharbein : Man bemerkt hinten und oben Verknöcherung (Nicolai). — Beide seitliche Hälften, erscheinend als dünne Knochenplättchen, sind am hinteren und unteren Rande in diesem Monate verwachsen (v. Ritgen). Länge $2-3'''$ (Nicolai).

Gaumenbeine : Pars palati $1\frac{3}{4}-2'''$ breit, $1\frac{1}{2}-\frac{3}{4}'''$ lang; Pars nasal. $1\frac{1}{2}-\frac{3}{4}'''$ hoch (Nicolai).

Muscheln : Verknöcherung der Muscheln (Kölliker), die unteren Nasenmuscheln fast ganz verknöchert (Orfila).

Siebbein : Zuweilen Verknöcherung desselben (Kölliker).

Unterkiefer : Der obere Rand hat mehrere Ausschnitte, der Angulus fängt an sich zu bilden (Nicolai). Hinten und oben 2 Spitzen (Nicolai, v. Ritgen), nach Letzterem ist der Winkelfortsatz weniger zugespitzt. Zwischen beiden ein Ausschnitt. Jedes Stück $7-8'''$ lang, vorn $1\frac{1}{2}'''$, hinten $1\frac{3}{4}'''$ hoch (Nicolai, v. Ritgen).

Erster Halswirbel : Seitentheile $1\frac{1}{2}-2'''$ lang (Nicolai).

Zweiter Halswirbel : Seitentheile $1\frac{3}{4}-2'''$ lang, $1\frac{1}{2}'''$ hoch (Nicolai).

Die 5 letzten Halswirbel : Höhe und Breite der Körper $1\frac{1}{2}'''$. Seitentheile $1\frac{3}{4}-2'''$ lang, $1\frac{1}{2}'''$ hoch (Nicolai).

rmige Krümmung hat zugenommen, es ist rundlich, Schulterende mehr platt.

Schulterblatt : Gräthe nähert sich dem hinteren Schulterattrande. Fossa supraspinata, Incisura colli scapulae den deutlich. Länge 5—6^{'''}, Breite 4^{'''} (Nicolai, Ritgen).

Oberarmbein : An beiden Enden platt, namentlich am oberen Ende, Gelenke deutlich (Nicolai, v. Ritgen). 3^{'''} lang.

Ellenbogenbein : Oben stärker als der Radius, Mittelk rund, Enden ohne Gelenkflächen und Fortsätze. Länge 8^{'''}, oben $\frac{3}{4}$ ^{'''}, unten $\frac{1}{2}$ ^{'''} dick (Nicolai). — Nach v. Ritgen : 10^{'''} lang, oben 1^{'''}, unten $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ^{'''}. Unverknöchert sind noch 4^{'''}.

Speiche : Nach Nicolai : 8^{'''} lang, $\frac{3}{4}$ —1^{'''} dick. — Nach v. Ritgen : Länge des ganzen Beins $8\frac{1}{2}$ —9^{'''}, Dicke 1^{'''}.

Mittelhand : Der Kern für den des Mittelfingers $1\frac{1}{2}$ ^{'''}, für den Knochen des Daumens $\frac{3}{4}$ ^{'''} lang, Dicke = (Nicolai).

Phalangen : a) Erste Reihe : Der Punkt in sämtlichen Enden $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ^{'''} lang nach Nicolai. — In diesem Monat knöchern drei Viertel der gegen $1\frac{1}{2}$ —2^{'''} langen Wirbel (v. Ritgen). b) Zweite Reihe : Der Zeige- und Mittelfinger zeigen Knochenpunkte (Nicolai); im vierten

und Krümmung ab (Nicolai).

Letzte Rippe : Angulus, Collum und Capitulum noch nicht sichtbar; 3—4''' lang, $\frac{1}{6}$ ''' dick, $\frac{1}{2}$ ''' hoch (Nicolai).

Brustbein : Es erscheinen Knochenpunkte nach Kölliker u. Böcker.

Darmbein : Vorn dick an der Pfanne, $3\frac{1}{2}$ —4''' hoch, 4—5''' von vorn nach hinten breit (Nicolai); nach v. Ritgen ist die Breite 3—6'', größte Höhe $4\frac{1}{2}$ '''.

Sitzbein : Keine deutliche Verknöcherung (Nicolai). — Es mißt der Schweif $1\frac{1}{4}$ '', das übrige Bein 2''' (v. Ritgen). Ossification im Sitzbein nach Kölliker.

Schambein : Nach Kölliker zuweilen Verknöcherung.

Oberschenkel : 8—10''' lang, oben 2''' dick, unten $2\frac{1}{2}$ ''' breit (Nicolai); bis zu 17''' lang (v. Ritgen).

Schienbein : nach Nicolai 4—5''' lang, oben $1\frac{1}{2}$ —2''' dick, unten $1\frac{1}{4}$ '. Nach v. Ritgen bis zum fünften Monat Knochenstück 1'', dick mitten $1\frac{1}{2}$ '', oben $2\frac{1}{4}$ '', unten $1\frac{3}{4}$ ''.

Wadenbein : Halb so dick als die Tibia, 8—9''' lang (Nicolai).

Fußwurzelknochen : Den Anfang des Knochenkerns im Fersenbeine sahen Nesbitt u. Mayer im vierten Monat.

Mittelfußknochen : Sämmtlich 2''' lang mit Ausnahme der großen Zehe, welche $\frac{3}{4}$ —1''' lang, $\frac{1}{2}$ ''' dick ist (Nicolai). In der 15. Woche ist der Mittelfußknochen der großen Zehe 2''' lang, $\frac{2}{3}$ ''' dick, der zweiten und

Woche die Länge des ganzen Gliedes an der großen Höhe 1¹/₄“, an den drei folgenden 1¹/₂—1¹/₃“, an der kleinen 1¹/₄“. Die zweiten Glieder sind noch nicht verknöchert (v. Ritgen).

Fünfter Monat.

Höhe des Skeletts 8—9 Zoll. Höhe des Kopfes 1¹/₄—2“, Breite des Schädels 18—22“, Länge des Schädels 18—21¹/₆“, Länge des Stammes 3³/₄—4¹/₂“, Länge der oberen Gliedmaßen 2¹/₂—3“, Länge der unteren Gliedmaßen 1¹/₄—2³/₄“ (Nicolai).

Stirnbein : Pars orbitalis liegt beinahe horizontal, Augenhöhle vollkommen. Die Hälften nähern sich in der Mitte. Incisura supraorbitalis schwach zu erkennen, Process. zygomat. wird deutlich, Tubera sind die Ossificationspunkte (Nicolai, v. Ritgen). — Höhe 1 Zoll, Breite ebenso (Nicolai); zuletzt ist es hoch 13—15“, breit 13—15“ (v. Ritgen).

Scheitelbeine : Ränder zeigen Knochenspitzen, die oberen Ränder sind beinahe in Berührung. Knochenkern im vorderen Theile (Nicolai, v. Ritgen). — Höhe 1¹/₄—1¹/₂“, Breite 1¹/₄—1¹/₂“ (Nicolai); Höhe 1¹/₄—1³/₄“, Breite 1¹/₄“ (v. Ritgen).

(Orfila). — Pars squamosa 4—5''' hoch, 5—7''' breit. Process. zygomat 3—4''' lang. Annulus ist im Querdurchmesser $3\frac{1}{2}$ —4''' groß. Pars mastoidea 2—3''' hoch, 2''' breit. Pars petrosa 4—6''' lang, 3—4''' breit.

Keilbein : Fossa pterygoidea, hamulus sichtbar, Strahlung der Ala magna. Superficies orbitalis kleiner als die übrigen. Masse wie im vorigen Monat (Nicolai).

Oberkiefer : Das For. infraorbitale ist sichtbar (Nicolai). Process. nasalis berührt das Stirnbein und zeigt Thränengrube und Thränenkanal. Außen am unteren Rande Joga alveolaria, Gesichtsfläche vertieft, untere Gaumenfläche löcherig. Höhe 5—6'', Breite 7—8'' (Nicolai, v. Ritgen). — Gaumentheil $3\frac{1}{2}$ —4''' lang, $1\frac{3}{4}$ —2''' breit, der Zahnhöhlenrand hat vorn die Breite von 2''' (v. Ritgen).

Wangenbein : Drei Flächen und 4 Winkel. Der Process. sphenoidalis ist ein scharfer Rand (Nicolai). — Höhe 4'', Breite 6—7'' (Nicolai, v. Ritgen).

Nasenbeine : Unterer Rand schief abgeschnitten, Höhe $1\frac{3}{4}$ —2'', oben 1'', unten $1\frac{1}{2}$ '' breit (Nicolai, v. Ritgen).

Thränenbeine : Ihre Gestalt oval, Rinne unterscheidbar. $1\frac{1}{2}$ —2'' hoch, 1'' breit (Nicolai, v. Ritgen).

Nasennebene : Nasentheil dünn, For. pterygo-palatin.
sich (Nicolai, v. Ritgen). — Pars palat. $2-2\frac{1}{2}'''$
 $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}'''$ lang; Pars nasalis $1\frac{1}{2}'''$ hoch (Nicolai).
Muscheln : Undeutliche Knochenmasse (Nicolai). —
Verknöcherung nach v. Ritgen, Kölliker, Hollstein.
Interkiefer : Gestalt hufeisenförmig, Ramus steigt in
stumpfen Winkel in die Höhe. In jeder Hälfte
zwei sichtbar (Nicolai, v. Ritgen). — Jede Hälfte
 $2'''$ lang, Höhe $2-2\frac{1}{2}'''$.

Erster Halswirbel : Länge der Seitentheile $3-3\frac{1}{2}'''$,
Fortsatz ungefähr $\frac{2}{3}'''$ lang (Nicolai).

Zweiter Halswirbel : Seitentheile $3\frac{1}{2}-3'''$ lang. Kno-
chenpunkt im Körper $1\frac{1}{2}-2'''$ hoch, $1'''$ breit (Nicolai).

Die 5 letzten Halswirbel : Körper $\frac{3}{4}-1'''$ hoch, $1'''$
Seitentheile $3-3\frac{1}{4}'''$ lang, $\frac{3}{4}-1'''$ hoch, ihre hin-
ter Enden werden bogenförmig und nähern sich einander
(Nicolai).

Rückenwirbel : Seitentheile, die nun auch am letzten
Wirbel verknöchern, sind $2\frac{1}{4}'''$ lang und $1\frac{1}{2}'''$ hoch,
Fortsatz $\frac{1}{2}'''$ lang, Körper $1'''$ hoch, $1\frac{1}{2}-2'''$ breit
(Nicolai).

Lendenwirbel : Seitentheile $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}'''$ lang, $1\frac{1}{2}'''$ hoch,
Höhe des Körpers $2\frac{1}{2}-3'''$, Höhe desselben $1\frac{1}{4}'''$
(Nicolai).

zum A
oberer
Ob
Grube,
v. Rit
 $3-3\frac{1}{2}$
oben 3
El
in der
Breite
lai, v.
Sp
stark (
am unt
M
die üb
Die D
v. Rit
 $2\frac{1}{6}'''$,
P
und R
und k
gen
finger
Letzte

um Acromion; Länge 7^{'''}, 6^{'''} breit, Gräthe 1^{'''} hoch, oberer Rand 3^{'''} lang (Nicolai, v. Ritgen).

Oberarmbein : Hinten am unteren Ende eine flache Grube, äußere Leiste am oberen Ende sichtbar (Nicolai, v. Ritgen). — Länge 13—15^{'''}, Dicke 2—2¹/₂^{'''}, unten 3¹/₂^{'''} breit (Nicolai). Nach v. Ritgen 1¹/₂^{'''} lang, oben 3^{'''}, unten 4^{'''}, mitten 2^{'''} dick.

Ellenbogenbein : Es wird kantig, 13^{'''} lang, oben 2^{'''}, in der Mitte 1^{'''} dick (Nicolai); Länge 1¹/₂^{'''}, größte Breite oben 2^{'''}, unten 1¹/₃^{'''}, geringste Breite 1^{'''} (Nicolai, v. Ritgen).

Speiche : Rund, 1^{'''} lang, unten 1¹/₂^{'''} dick, mitten 1^{'''} stark (Nicolai). — Nach v. Ritgen : 14—15^{'''} lang, am unteren Ende 1²/₃^{'''} breit, in der Mitte kaum 1^{'''}.

Mittelhand : Der Knochen des Daumens 1—1¹/₄^{'''} lang, die übrigen nehmen zum kleinen Finger hin an Länge ab. Die Dicke vorn ³/₄^{'''}, hinten ¹/₂^{'''} (Nicolai). — Nach v. Ritgen 2. Mittelhandknochen 3^{'''} lang, 3. 2⁵/₆^{'''}, 4. 2¹/₆^{'''}, 5. 2⁵/₆^{'''}, 1. 2¹/₆^{'''}.

Phalangen : a) erste Reihe : Länge am Zeige-, Mittel- und Ringfinger 1—1¹/₂^{'''}, Breite ³/₄^{'''}. Der des Daumens und kleinen Fingers ¹/₂^{'''} lang (Nicolai). — Nach v. Ritgen : am Mittelfinger 2¹/₂^{'''}, worauf abnehmend Zeigefinger, Ringfinger, Daumen, dann Ohrfinger folgen. Bei Letzterem ist die Länge 2^{'''}. — b) 2. Reihe : die der 3

Brustbein : Verknöcherung nach Beclard in der Schwangerschaft, nach Meckel zwischen dem 6. und 6., nach Mayer selten vor dem 6. Monat. Es beginnt zu verknöchern nach Orfila, in diesem oder im nächsten Monate nach Kölliker. — Gegen Ende dieses Monats im Griff, ungefähr zu gleicher Zeit erscheinen Kerne für das 1. und 2. Stück des Körpers (Hollstein).

Darmbein : Oberer Rand lang, der untere Rand hat einen Ausschnitt, vorderer Rand ist breit. Pars iliaca nach unten gebogen, Linea arcuata interna undeutlich. Faser geht vom Körper aus. Länge 5—6", Breite 6—7" (Nicolai). — Größte Breite des ganzen Beins 8½", größte Breite 4", größte Höhe 7" (v. Ritgen).

Sitzbein : Zuweilen in diesem Monat nach Kölliker. Nach Nicolai 2—2½" hoch, oben 1½—2" breit, unten 1" breit, 1½" oben dick; nach v. Ritgen : Länge 2", Dicke des verknöcherten Kopfes 1", des Halses ½", Höhe des verknöcherten Blatts ¾".

Schambein : Verknöcherung nach Nicolai, v. Ritgen, Orfila, Kölliker, Hollstein. Länge 1½", Höhe 1" (Nicolai); das verknöcherte Stück ist oben 2", unten 1" breit (v. Ritgen).

Oberschenkel : Länge 12—15", oben 2—3" dick, unten 3" breit (Nicolai). Länge des verknöcherten

nach v. Ritgen $1\frac{1}{4}'''$.

Phalangen : In der ersten Reihe sichtbare Glieder (Nicolai). — Nach v. Ritgen in der 17. Woche : Länge der grossen Zehe $2\frac{1}{3}'''$, der 2., 3. und 4. $2\frac{1}{4}'''$, der 5. $1\frac{3}{4}'''$. Knorpelig an der grossen Zehe $\frac{1}{3}'''$, an den drei folgenden $\frac{5}{8}'''$, an der letzten $\frac{6}{8}'''$.

In der zweiten Reihe : Nichts verknöchert (Nicolai, v. Ritgen).

In der dritten Reihe : Unbestimmte Gestalt (Nicolai). Nach v. Ritgen : in der 17. Woche der Wirbel der grossen Zehe $1\frac{2}{3}'''$, der 3 folgenden $\frac{2}{3}'''$, der kleinen $\frac{1}{3}'''$.

Sechster Monat.

Höhe des Skeletts $11—11\frac{1}{2}''$, Höhe des Kopfes $2—2\frac{1}{4}''$, Breite des Schädels $2\frac{1}{6}—2\frac{1}{4}''$, Länge des Schädels $2\frac{1}{4}—2\frac{3}{4}''$, Länge des Stammes $5—5\frac{1}{2}''$, Länge der oberen Gliedmaßen $3\frac{3}{4}—4\frac{1}{4}''$, Länge der unteren Gliedmaßen $3—3\frac{3}{4}''$ (Nicolai).

Stirnbein : Die Hälften berühren sich in der Glabella, Incisura supraorbitalis wird deutlich (Nicolai). Halbkreisige Linie ward sichtbar und an den Rändern die Winkel (Nicolai, v. Ritgen). Deckblatt der Augenhöhle beinahe wagerecht, grosse Fontanelle wird kleiner,

Hervorragungen getheilt, Pars basilaris gabelförmig, occipit. $1\frac{1}{2}$ '' lang, Pars condyl. $\frac{1}{2}$ '' lang, Pars basi- $3\frac{1}{2}$ '' lang (Nicolai, v. Ritgen).

Schläfenbeine: Die einzelnen Theile deutlich zu unterscheiden. Fenestra rotunda et ovalis mit Knochen umgeben, t. articularis und Tuberc. articulare bilden sich. Pars ossa noch nicht mit der Schuppe verbunden und deswegen die Paukenhöhle offen. Anfang des knöchernen Canalic. — Annulus an einigen Stellen $\frac{1}{2}$ '' breit (Nicolai, v. Ritgen).

Keilbein: Es bildet sich das 7. Paar Kerne aus im vordern Umfange des Sehlochs (v. Ritgen). For. ovale von Knochenmasse umgeben (Nicolai, v. Ritgen). Man sieht eine Trennung zwischen innerem und äußerem For. des Proc. pteryg. (Nicolai). — Höhe der Ala magna 4'', Proc. pterygoid. 4—5''.

Oberkiefer: Anfang des Canal. infraorbital., unterer Rand der Augenhöhle scharf, Spin. nas. ant. deutlich, Knochen für die Keime der Zähne (Nicolai, v. Ritgen). In der Mittellinie werden die beiden seitlichen Hälften des Gesichtstheils etwas höher und kleben an einander, so dass der Satz zum Stirnbein erreicht dieses. Weiter als im 7. Monat stehen vorn von einander ab die äußere und innere Wand des Zahnhöhlenrandes (v. Ritgen). — Länge 7—8'', Breite 9—10'' (Nicolai, v. Ritgen).

an der
ren R
(Nico
P)
Länge
G
Nasent
M
merkt
Monat
der au
U
die Za
For. m
Kopf
wickel
das K
drückt
tiefer
lang, 3
E
Querf
Z
theile
lang.

n den Lücken der Augen- und Schneidezähne. Am inneren Rande 1''' , am äußeren $1\frac{1}{2}$ ''' lang, Breite $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ ''' (Nicolai).

Pflugscharbein : Nimmt seine bestimmte Form an. Länge 4—5''' (Nicolai).

Gaumenbeine : Gaumentheil 3''' breit, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ ''' lang. Nasentheil 2—3''' hoch (Nicolai).

Muscheln : In der unteren und mittleren Muschel bemerkt man Verknöcherung (Nicolai). — Form im 6. Monat vollkommen mit Ausnahme der des Kieferfortsatzes, der auch im 9. Monate noch fehlt (v. Ritgen).

Unterkiefer : An jedem Stück vorn eine Erhöhung, die Zahnücke für den Hundszahn. Alveoli bemerkbar, For. mentale angedeutet, vorn eine Grube (Nicolai). — Kopf und Hals haben sich am Gelenkende mehr entwickelt, Hauptast und Gelenkstück sind leicht gebogen, das Kinn ist noch von beiden Seiten stark zusammenge- drückt, Kinnloch vorhanden, Zahnladenloch in Form tiefer Rinne (v. Ritgen). — Jede Hälfte ungefähr 1'' lang, 3 — $3\frac{1}{2}$ ''' hoch (Nicolai, v. Ritgen).

Erster Halswirbel : Seitentheile 4—5''' lang, 1''' breit, Querfortsatz 1''' lang (Nicolai).

Zweiter Halswirbel : Körper 2''' hoch, 2''' breit, Seitentheile 5—6''' lang, hintere Wurzel der Querfortsätze $\frac{2}{3}$ ''' lang. Ein Knochenkern im Proc. odontoideus (Nicolai).

Leuzbein : Von 5 Knochenpunkten für den Körper
erste, größte $1\frac{1}{2}'''$ hoch, $2\frac{1}{2}'''$ breit, der letzte
sch, breit und rund. Drei seitliche Knochenpunkte
g, $1-1\frac{1}{2}'''$ hoch (Nicolai). Alle 5 Wirbelkörper
einen Knochenpunkt (v. Ritgen).

Schlüsselbein : Länge $14'''$, vorn $2'''$ hoch, hinten $2'''$
(Nicolai, v. Ritgen).

Schulterblatt : Länge $10'''$, Breite $6-7'''$. Gelenk
n, Proc. coronoideus fehlt, Incisura supra scapularis
en und 2 Lefzen an der Gräthe, die breiter wird
lai, v. Ritgen).

Oberarmbein : Am unteren Ende die hintere deutlich,
r Condylus sichtbar. Am oberen Ende eine Rinne
Leiste $16'''$ lang, $3'''$ dick, unten $4-4\frac{1}{2}'''$ breit
lai). — Länge $19'''$, größte Dicke $3'''$, geringste
 $2'''$, Breite $4'''$ (v. Ritgen).

Ellenbogenbein : Oberes Ende nach vorn gebogen,
ng, oben $3'''$ dick, unten $1\frac{1}{2}'''$ dick (Nicolai). —
 $20'''$, größte Dicke oben $3'''$, unten $2'''$, geringste
 $1'''$. Unverknöchert sind oben $2\frac{1}{2}'''$, unten $2\frac{1}{2}'''$
gen).

eiche : Oben rund mit einer kleinen Erhabenheit,
viereckig (Nicolai). — Länge $16'''$, oben $1\frac{1}{2}'''$,
 $\frac{3}{4}'''$ breit (Nicolai, v. Ritgen).

$1'''$ (N
Dr
wie im
Daumen
am Zeig
Er
Sie
hoch, 1
Let
Br
punkt (N
das Ste
Da
hypoga
anterio
 $8'''$, F
v. Rit
größte
Si
oben 3
v. Rit
S
hoch (N
des K

1''' (Nicolai).

Dritte Reihe : Gestalt scheint sich zu verändern, sonst wie im vorigen Monat (Nicolai). Nach v. Ritgen : am Daumen $1\frac{3}{4}$ ''' , am Ringfinger $1\frac{7}{12}$ ''' , am Mittelfinger $1\frac{1}{2}$ ''' , am Zeigefinger Länge $1\frac{3}{8}$ ''' . Unverknöchert ist noch $\frac{1}{7}$ ''' .

Erste Rippe : 7—8''' lang, vorn 1''' breit (Nicolai).

Siebente Rippe : Vom Tuberculum nach vorn wohl 2'' hoch, $1\frac{1}{2}$ ''' dick, Höhe am Angulus $1\frac{1}{2}$ ''' (Nicolai).

Letzte Rippe : $\frac{1}{2}$ Zoll lang, 1''' hoch (Nicolai).

Brustbein : Im Körper 2 und im Manubrium 1 Knochenpunkt (Nicolai, v. Ritgen). Im 6. oder 7. Monat zeigt das Sternum 3—4 Puncta ossificationis (Orfila).

Darmbein : Man kann unterscheiden Partes iliacae und hypogastr., Incisura ischiadica, ohrförmige Grube, Spina anterior superior und unter ihr einen Ausschnitt. Höhe 8''' , Breite 10''' , Körper 3''' dick (Nicolai). Nach v. Ritgen : größte Breite 11''' , geringste Breite 5''' , größte Höhe 8''' .

Sitzbein : Gestalt ist dreieckig-eiförmig, Höhe 4—5''' , oben $3\frac{1}{2}$ ''' , unten 2''' breit, oben $2\frac{1}{2}$ ''' dick (Nicolai, v. Ritgen).

Schoofsbein : Rundlich gestaltet, $\frac{1}{2}$ ''' lang und $1\frac{1}{2}$ ''' hoch (Nicolai). Länge 3''' , Höhe des Blatts 1''' , Dicke des Kopfs $1\frac{1}{2}$ ''' , des Halses $1\frac{1}{4}$ ''' (v. Ritgen).

ker, Hollstein, Meckel). In beiden zuweilen
7. Monat nach Kölliker.

telfufsknochen : Länge sämtlicher Knochen ist

Dicke der grossen Zehe $1\frac{1}{2}'''$ (Nicolai). — Nach
gen : Länge des Knochens der grossen Zehe $5'''$,
 $1\frac{1}{2}'''$, Länge des 2. 3. 4. = $5\frac{1}{2}'''$, Breite $1'''$; Länge
 $6'''$, Breite $1'''$. Unverknöchert ist an jedem Ende
telfufsknochens der grossen Zehe $\frac{3}{4}'''$, der übrige

langen : Länge der ersten Glieder $1-2'''$, Breite
 $1'''$. Was die zweiten Glieder anlangt, so sind die
and dritte Zehe sichtbar. Die letzten Glieder sind
dlich gestaltet nach Nicolai. — *Erste Zehenglieder* :
des ganzen Wirbels der grossen Zehe $3'''$, der fol-
dreier $2\frac{1}{2}'''$, der letzten $2\frac{1}{4}'''$. Jedes knorpelige
ist an der grossen Zehe $\frac{1}{2}'''$, an den folgenden
 $1'''$, an der fünften $\frac{1}{2}'''$. *Mittlere Zehenglieder* : Die
 $1\frac{1}{4}'''$ bis $1\frac{1}{2}'''$. *Letzte Zehenglieder* : Länge $3'''$,
 $1\frac{1}{4}'''$, $\frac{1}{2}'''$ (v. Ritgen).

Siebenter Monat.

he des Skeletts $11\frac{1}{2}-12\frac{1}{2}$ Zoll. Höhe des Kopfes
 $4'''$. Breite des Schädels $2-2\frac{3}{4}$ Zoll. Länge des
s $2''10'''$, Länge des Stammes $5\frac{1}{2}-6$ Zoll. Länge

(Nicolai). Der vordere Rand $2-2\frac{1}{2}''$, der hintere $2''$, der obere $2\frac{1}{4}''$, der untere $2''$ (v. Ritgen).

Hinterhauptsbein : Die Einschnitte der Pars occipitalis verschwinden, der Condyl. steht an der Pars condyl. hervor, die mit ihrem hinteren Rande mit dem äusseren der Pars occipit. in Berührung steht. Process. anonymus sichtbar, For. condyl. anter. vorhanden, Pars basilaris, Foramen magnum deutlich. Gestalt und Grösse wenig vom vorigen Monat verschieden (Nicolai, v. Ritgen).

Schläfenbein : Pars mastoid. und squamosa unten mit einander verbunden. Annulus, an dem eine Rinne, ist noch von den übrigen Knochentheilen getrennt. Pars squamosa $9-9\frac{1}{2}'''$ hoch, $5-6'''$ lang. Proc. zygomat. $4-4\frac{1}{4}'''$ lang. Annulus tympani $4-5'''$ im Längs-Durchmesser. Pars petrosa $7-8'''$ lang, $4-5'''$ breit (Nicolai, v. Ritgen).

Keilbein : Der Zwischenraum zwischen der Ala magna, Proc. zygomat. oss. front., dem unteren vorderen Winkel des Scheitelbeins und der Pars squamosa schliesst sich; Foramen rotundum von Knochenmassen umgeben, Spina transversalis an der äusseren Fläche der Ala magna. — Höhe der Ala magna $9'''$, Breite oben $3-4'''$. Proc. pteryg. $4-5'''$ lang (Nicolai, v. Ritgen).

Oberkiefer : Im oberen Knochenrande des For. infra-orbitale eine Trennung, ein Einschnitt. Tuberosit. maxill. wird sichtbar, unter dem Proc. zygomat. ein Ausschnitt,

Thränenbeine : Crista und vordere Grube vorhanden.
2—2³/₄''' , Breite 2—2¹/₄''' (Nicolai, v. Ritgen).
Zwischenkieferbeine : Vorn spitz und liegen in der
Bindung der Oberkiefer, sonst begrenzen sie die Zäh-
nen der Schneidezähne. Von vorn nach hinten 1'''
1¹/₂''' breit (Nicolai).
Pflugscharbein : Länge 6—7''' (Nicolai).
Gaumenbeine : Pars palat. 3—4''' breit, 2''' lang.
nasalis 2—3''' hoch (Nicolai).
Muscheln : Als gebogene und gewundene Knochen-
en sichtbar (Nicolai).
Unterkiefer : Jedes Stück ragt vorn spitz nach unten,
aber eine Grube. Hinten bildet die innere Lefze die
e Wand des Canal. alveolar. Die Lefzen des Alveo-
des sind durch Querwände getheilt. Vorn innen eine
kleine Erhabenheit, die äußere Fläche des Ramus
vertieft. Jede Hälfte 1'''3—4''' lang, 3—4''' hoch
(Nicolai). Nach v. Ritgen : Kieferhälften nicht mehr
ark gesenkt, Hauptast wird mehr horizontal, Grube
inn noch tief, die innere Kinngräthe entsteht. Winkel
sehr stumpf und abgerundet. Zahnladengang fängt
uch oben von Knochenmasse geschlossen zu werden.
e 1¹/₄—1¹/₃'' , Höhe vom Winkel zur Kronenspitze
m Kinn 3'''—4''' , Kronenfortsatz 3''' .
Erster Halswirbel : Der vordere Bogen hat noch keinen

tung der schiefen Fortsätze. Zur Verbindung mit den Rippen an den Querfortsätzen eine kleine Fläche. Höhe $2\frac{1}{4}'''$, Breite $2\frac{3}{4}''$ — $3'''$, der letzte Rückenwirbel $4'''$ breit, $1\frac{1}{2}'''$ hoch (Nicolai).

Lendenwirbel : Eine stumpfe Hervorragung als Querfortsatz. Höhe des Körpers $2'''$, die Breite 4 — $4\frac{1}{2}'''$, Höhe der Seitentheile 2 — $2\frac{1}{2}'''$, Länge 4 — $5'''$ (Nicolai).

Kreuzbein : Zu den Seiten jedes Wirbels 2 Knochenkerne, welche die falschen Querfortsätze andeuten. Höhe der Körper $1\frac{2}{3}'''$ (Nicolai). — Oberster Körper 3 — $3\frac{1}{2}'''$ hoch und 5 — $5\frac{1}{2}'''$ breit (v. Ritgen).

Schlüsselbein : Länge $16'''$, Höhe und Breite $2'''$ (Nicolai); Länge 16 — $17'''$ (v. Ritgen).

Schulterblatt : Acromion ragt über den Gelenktheil $2'''$ hervor, *Incisura suprascapularis* deutlich. Ausschnitt des Halses $1\frac{1}{2}'''$ lang, Länge $1''$, Breite $9'''$ (Nicolai, v. Ritgen).

Oberarmbein : *Tuberculum majus* wird sichtbar, Länge 20 — $22'''$, $3\frac{1}{2}$ — $4'''$ dick, unteres Ende $4\frac{1}{2}$ — $5'''$ breit nach Nicolai. Länge 21 — $22'''$, größte Dicke $3\frac{1}{2}'''$, geringste Dicke $2\frac{1}{4}'''$, Breite am unteren Ende $4\frac{1}{2}'''$ (v. Ritgen).

Ellenbogenbein : Anfang des *Proc. coronoideus*. Länge $18'''$, oben $3\frac{1}{2}$ dick (Nicolai). — Länge 21 — $22'''$, größte Dicke oben $4'''$, unten $2\frac{1}{4}'''$, geringste Dicke $1\frac{1}{4}'''$. — Unverknöchert sind oben $3'''$, unten $2\frac{1}{2}'''$ (v. Ritgen).

Zweite Gliederreihe : Das Glied des Mittelfingers $3\frac{1}{4}'''$,
eige- und Ringfingers $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}'''$, des kleinen Fingers
lang (Nicolai).

Dritte Gliederreihe : Die Glieder 1 — $1\frac{1}{2}'''$ lang, vorn
inten $\frac{3}{4}'''$ breit (Nicolai). — Das Glied des Dau-
 $2'''$, des Ringfingers $1\frac{5}{6}'''$, des Mittelfingers $1\frac{8}{9}'''$,
eigefingers $1\frac{5}{8}'''$, des Ohrfingers $1\frac{1}{2}'''$ (v. Ritgen).

Erste Rippe : 7 — $8'''$ lang, vorn $1\frac{1}{2}'''$ breit (Nicolai).

Siebente Rippe : Länge vom Tuberculum $2''$ und 1 — $2'''$,
vorn $2'''$, Dicke $1\frac{1}{2}'''$ (Nicolai).

Letzte Rippe : Länge $7'''$, vorn $1'''$ hoch (Nicolai).

Brustbein : Im Körper 3 — 4 Knochenpunkte, im Ma-
 1 Punkt (Nicolai, v. Ritgen).

Armbein : Aeufsere Fläche ist vorn rundlich, hinten
v, innere obere Fläche concav mit einem Loche.
 $9'''$, 10 — $11'''$ lang, $3\frac{1}{2}'''$ dick (Nicolai). — Gröfste
 $1''$ bis $13'''$, geringste $5'''$ bis $5\frac{1}{2}'''$, gröfste Höhe
v. Ritgen).

itzbein : Aeufsere Fläche durch eine Querleiste ge-
Birnförmig, unten spitz. Höhe 5 — $6'''$, Breite oben
unten $2'''$, Dicke oben $2\frac{3}{4}'''$ (Nicolai). — Länge
röfster Umfang des Kopfes $2\frac{1}{4}'''$, im kleinsten Um-
desselben $1\frac{3}{4}'''$, im gröfsten Umfange des Halses $2'''$,
lattes $2'''$ (v. Ritgen).

dick
W
dick (N
(v. Ri
F
stein
M
 $1\frac{1}{2}'''$
hoch (N
Zehe 6
breit,
deren
am hin
 $1\frac{1}{2}'''$,
Ph
grofsen
v. Ritg
Knorpe
— Die
(Nicol
Hö
 $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$

ick mitten 2''' , oben $4\frac{1}{4}$ ''' , unten 4''' (v. Ritgen).

Wadenbein : Länge 19''' , oben $1\frac{3}{4}$ ''' und unten 2'''
ick (Nicolai) — Oben 2''' , unten $2\frac{3}{4}$ ''' , mitten $\frac{5}{6}$ ''' dick
v. Ritgen).

Fußwurzelknochen : Verknöcherung im Talus (Holl-
stein). Ossification im Calcaneus nach Kerkring.

Mittelfußknochen : Der der großen Zehe 3— $3\frac{1}{2}$ ''' lang,
 $1\frac{1}{2}$ ''' breit , die der übrigen $3\frac{3}{4}$ — $4\frac{1}{4}$ ''' lang , vorn $1\frac{1}{4}$ '''
hoch (Nicolai). — Nach v. Ritgen : der der großen
Zehe 6''' lang , 2''' breit ; der 2. , 3. und 4. 7''' lang , $1\frac{1}{2}$ '''
breit , der 5. 6''' lang , 1''' breit. Unverknöchert am vor-
deren Ende des Mittelfußwirbels der großen Zehe $1\frac{1}{2}$ ''' ,
am hinteren 1''' , an beiden Enden der 2. , 3. und 4. Zehe
 $1\frac{1}{2}$ ''' , an der 5. $1\frac{1}{4}$ ''' .

Phalangen : *Erste Glieder* sämtlich 2''' lang , das der
großen Zehe $1\frac{1}{4}$ ''' breit (Nicolai). — *Erste Reihe* nach
v. Ritgen : Länge der 4 ersten $3\frac{1}{2}$ ''' , der 5. Zehe $2\frac{3}{4}$ ''' .
Knorpelig ist an den 4 ersten Zehen 1''' , an der 5. $1\frac{1}{2}$ ''' .
— Die anderen Reihen noch undeutlich und knorpelig
(Nicolai, v. Ritgen).

Achter Monat.

Höhe des Skeletts 14—15 Zoll. Höhe des Kopfes
 $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ Zoll. Breite des Schädels 3 Zoll. Länge des

Hinterhauptsbein : Spina occipit. externa deutlich, Pars occipitis 2'' hoch; Pars condyl. berührt die Pars mastoidea Pars occipitis, ihre Länge ist 7'', Breite 3''; Pars parietalis 5'' lang, die Verbindung zu einem Stücke rückt näher (Nicolai). Spina occipitalis externa erreicht Hinterhauptsloch, welches hinten zum Theil noch mit Knorpel umgeben ist, noch nicht. Die Einschnitte der Lamellen werden zu Nähten. Pars condyl. verschmilzt mit Zapfenstück (v. Ritgen). In den Maßen stimmt Nicolai bei.

Schläfenbeine : Sitzentheil, welcher den Proc. mastoid. berührt, die hintere Wurzel des Proc. zygomatic. zeigt, ist mit dem Schuppentheil verbunden. Spuren der Zellen des Process. mastoideus zeigen sich als Gruben im Cav. tympanicum (Nicolai). — Der lange Fortsatz des Hammers liegt zwischen dem Ringe und der Gelenkgrube, die hintere Wurzel des Jochbeinfortsatzes zeigt sich als ein Höcker (v. Ritgen).

Keilbein : Foramen spinosum von Knochenmasse umgeben, hinterer Rand der Ala magna berührt die Schuppe (Nicolai, v. Ritgen). Das hintere Stück des Keilbeins verwächst mit dem vorderen, es verwachsen die Enden der großen Flügel unter einander und dann auch die Enden der kleinen Flügel. Bald darauf verwachsen die aufse-

M
T
Breite
Z
die im
durch
vom v
P
scharf,
lai, v.
G
pyram
gräthe
M
die en
U
Am G
v. Ri
hoch
Wink
Gegen
Z
Nesb
ficatio
Zeit g

Nasenbeine : Vergrößerung (Nicolai, v. Ritgen).

Thränenbeine : Gestalt ziemlich vollkommen, Länge 3''' , Breite $2\frac{3}{4}$ ''' (Nicolai, v. Ritgen).

Zwischenkieferbeine : Foramen incisivum gebildet durch die inneren Ränder, vordere mittlere Zahnlücken begrenzt durch die hinteren. Gestalt schiefviereckig. In Gröfse vom vorigen Monate nicht verschieden (Nicolai).

Pflugscharbein : Unterer Rand stärker und vorn scharf, legt sich auf die entstehende Crista nasalis (Nicolai, v. Ritgen).

Gaumenbein : Es beginnt die Entwicklung der Pars pyramidalis und des Nasenkamms mit der hinteren Nasen- gräthe (Nicolai, v. Ritgen).

Muscheln : Sie sind weniger gewunden, haben aber die entsprechende Gestalt (Nicolai).

Unterkiefer : Canalis alveolar. wird oben geschlossen. Am Gelenkfortsatze wird die Epiphyse sichtbar (Nicolai, v. Ritgen). — Länge jeder Hälfte 1 — $1\frac{1}{2}$ '' , vorn 5'' hoch (Nicolai). — Länge $1\frac{1}{2}$ '' , Höhe am Kinn 5'' , vom Winkel zur Kronenspitze $7\frac{1}{2}$ — 8'' , in der mittleren Gegend 4'' (v. Ritgen).

Zungenbein : Verknöcherung desselben nach Kölliker, Nesbitt und Hollstein. Meckel bestimmt die Ossification gegen Ende der Schwangerschaft, ohne jedoch die Zeit genauer anzugeben.

ten Wirbels $1\frac{1}{2}''$ (Nicolai).

Rückenwirbel : Spur des Dornfortsatzes (Nicolai).

Lendenwirbel : Seitentheile berühren sich hinten, Gelenkflächen an den schiefen Fortsätzen undeutlich klein (Nicolai).

Kreuzbein : Zwei Knochenpunkte zwischen der Cavitas sacularis des Darmbeins und den ersten falschen Wirbeln Kreuzbeins. Seitentheile $2''$ lang (Nicolai). — Letzten Wirbel des Os sacrum ein Knochenpunkt nach Filula.

Schlüsselbein : Bleibende Gestalt ist erreicht, Länge $18''$ (Nicolai, v. Ritgen).

Schulterblatt : Gräthe entfernt sich in ihrem Anfange an inneren Rande, ihre Facies triangularis fehlt, die beiden Fossae spinatae gehen in einander über. Länge $15''$, Breite $10''$ (Nicolai), Länge $16-17''$, Breite $12-13''$ (v. Ritgen).

Oberarmbein : Gröfse nimmt zu, Tuberculum minus bildet sich. Oberes Ende ohne Kopf und Hals (Nicolai). Länge $25-26''$, grösste Dicke $3\frac{1}{2}''$, geringste Dicke $2''$, Breite $6''$ (v. Ritgen).

Ellenbogenbein : Gelenkfläche fürs Capitulum radii, Länge $20-22''$ (Nicolai). — Länge $25-26''$, grösste Dicke oben $5''$, unten $2\frac{1}{2}''$, geringste Dicke $1\frac{2}{3}''$ (v. Ritgen).

Zeige-, Mittel- und Ringfingers 3^{'''}, Breite hinten 1^{'''} (Nicolai). — Länge der verknöcherten Stücke am Mittelfinger 4^{'''}, am Ringfinger 3^{7/8}^{'''}, am Zeigefinger 3^{7/8}^{'''}, am Daumen 2^{1/2}^{'''} (v. Ritgen).

Zweite Gliederreihe : Mittelfinger 3^{1/2}^{'''}, Ring- und Zeigefinger 2^{1/2}^{'''} lang, unten hohl, oben convex (Nicolai). — Es mißt das verknöcherte Stück des Mittelfingers 3^{'''}, des Ringfingers 2^{11/12}^{'''}, des Zeigefingers 2^{7/8}^{'''}, des Ohrfingers 2^{'''}. Gegen 1^{'''} der Länge der Wirbel ist unverknöchert (v. Ritgen).

Dritte Gliederreihe : Länge der Glieder 1^{1/2} — 1^{3/4}^{'''} mit Ausnahme des Daumens, welches 2^{'''} lang ist (Nicolai). — Glied des Daumens 2^{1/2}^{'''}, des Ringfingers 2^{1/3}^{'''}, des Mittelfingers 2^{1/4}^{'''}, des Zeigefingers 2^{1/8}^{'''}, des Ohrfingers 2^{'''} lang. Unverknöchert ist noch ¹/₅^{'''} (v. Ritgen).

Erste Rippe: Angulus deutlich, Länge 8—9^{'''} (Nicolai).

Siebente Rippe : Am Angulus sind höher die 7., 8., 9. und 10. Rippe (Nicolai).

Letzte Rippe : Länge 8^{'''} (Nicolai).

Brustbein : Im Körper 3—4 Knochenpunkte, der im Manubr. ist 3^{'''} hoch, 2^{'''} breit (Nicolai). Ebenso v. Ritgen.

Darmbein : Spin. poster. superior und inferior vorhanden. Höhe 11^{'''}, Breite 13^{'''} (Nicolai). — Am Ende des Monats größte Breite 15^{'''}, geringste Breite 6—6^{1/2}^{'''},

Schambein : Dicke an der Pflanne $1\frac{3}{4}$ — $2''$, absteigenden Ast $1''$ lang. Körper und Querast dreieckig (Nicolai). — Am Ende des 8. Monats hat die Länge $5''$, grösster Umfang des Kopfes $3''$, kleinster Umfang des Halses $2\frac{3}{4}''$, des Blatts $1''$ (v. Ritgen).

Oberschenkelbein : Andeutung des Halses, Länge $2''$ (Nicolai); Länge überhaupt $3''$, Dicke oben $8''$, unten $9''$; Länge des verknöcherten Theiles $2\frac{1}{4}''$ dessen Dicke oben $6''$, unten $7''$, mitten $2\frac{1}{2}''$ (v. Ritgen).

Schienbein : Oben und aussen eine Gelenkfläche für's tulum fibulae. Vergrößerung (Nicolai). — Länge des verknöcherten Stückes $1''$ $10''$, dick mitten $3''$, oben $4''$, unten $6\frac{1}{2}''$ (v. Ritgen).

Wadenbein : Unten die Tibia kürzer. Länge 21 — $23''$ (Nicolai). — Dicke oben $2\frac{1}{2}''$, unten $2\frac{3}{4}''$, mitten $1''$ (v. Ritgen).

Fusswurzel : Ein 2 — $3''$ langer Knochenkern im Calcanus (Nicolai). — Während der Fötuszeit meistens Verknöcherung im Calcaneus und Talus, seltener im Metatarsalbein und Würfelbein (v. Ritgen).

Mittelfussknochen : In der Mitte sind sie höher als die Enden, zeigen einen Rücken und Plantarrand. Die Enden sind dick (Nicolai). — Mittelfussknochen der grossen Zehe $7''$ lang, $2\frac{1}{2}''$ breit, der zweiten, dritten und vierten

knorpelig

Es

Höb

Breite d

Länge

massen

(Nicol

Stir

theils i

in der

wahre

bedeute

v. Rit

$\frac{1}{2}''$ br

Sc

3 — $3\frac{1}{4}$

oberen

gliedmaßen bilden sich schon zur Fötuszeit die ersten knorpeligen Anfänge (v. Ritgen).

Neunter Monat.

Es fehlen Beobachtungen oder Angaben für diese Zeit.

Zehnter Monat.

Höhe des Skeletts 16—18'', Höhe des Kopfes 4—4 $\frac{1}{4}$ '', Breite des Schädels 3 $\frac{1}{4}$ —3 $\frac{1}{2}$ '', Länge des Schädels 3 $\frac{1}{2}$ —4'', Länge des Stammes 7 $\frac{1}{2}$ —8'', Länge der oberen Gliedmaßen 7—7 $\frac{2}{3}$ '', Länge der unteren Gliedmaßen 6—6 $\frac{3}{4}$ ' (Nicolai).

Stirnbein : Die inneren Ränder berühren sich meistens in der Stirnnaht, Incisura supraorbitalis vollendet, in der flacher gewordenen Thränengrube haben sich zwei wahre und ein blindes Loch gebildet. Höckergegend tritt bedeutend vor. Höhe und Breite 2—2 $\frac{1}{4}$ ' (Nicolai, v. Ritgen). — Fontanelle nach v. Ritgen $\frac{2}{3}$ '' lang, $\frac{1}{2}$ '' breit.

Scheitelbeine : Normale Gestalt. Höhe 3—3 $\frac{1}{4}$ '', Breite 3—3 $\frac{1}{4}$ ' (Nicolai). Höhe 3 $\frac{1}{4}$ '', Breite 3 $\frac{1}{2}$ '', Länge des oberen Randes 3 $\frac{1}{4}$ '', des vorderen 3'', des unteren 2 $\frac{1}{2}$ '',

s condyloideae 1'' lang, hinten $\frac{1}{2}$ '', vorn $\frac{1}{3}$ '' breit.
basilaris $\frac{1}{2}$ '' lang (Nicolai, v. Ritgen). Der
hen besteht noch aus 4 Stücken (Nicolai, Holl-
n).

Schläfenbein : Strahlung der Schuppe wird schwächer,
is caroticus liegt tief in der Knochenmasse verborgen,
a jugularis hat sich gebildet am hinteren Theile des
nstücks, Ring verbindet sich mit dem Felsenstück.
der Schuppe 11—13'', mit dem Zitzenfortsatze breit
0''. - Fortsatz zum Jochbein lang 8—9''. Felsen-
lang 1'', breit 4—5'' (Nicolai, v. Ritgen).

Keilbein : Besteht aus 3 Stücken, ist noch nicht mit
Hinterhauptsbein vereinigt, Löcher vorhanden. Process.
alis deutlich. Höhlen noch nicht vorhanden. Ala
a 11—13'' hoch, Flügelfortsätze 6—7'' (Nicolai,
tgen). Zur Zeit der Geburt besteht das Keilbein
aus 5 getrennten Stücken (Hollstein).

Oberkiefer : Fossa canina ausgebildet, deutliche Rinne
en Can. infraorbitalis. Das Foramen incisivum wird
vom Os intermaxillare begrenzt. Höhe 11—12'',
e 13—14'' (Nicolai). — Höchste Höhe des Gesichts-
11—12'', größte Breite 13—14''; Höhe unter der
 $3\frac{1}{2}$ —4''. Breite des Zahnhöhlenraums 3'', Breite
aumenfläche jeder seitlichen Hälfte ohne Zahnhöhlen-
4 $\frac{1}{2}$ —5'' (v. Ritgen).

(Nicol
Pfl
7—8''
Ga
nasalis 1
M
Un
veolar.,
Höhe 5
Kinn 6
gerings
Astes 9
einande
dick.
rand v
Er
satz 1
Orfila
Zu
toid. 3
7—8''
D
und de
Seiten

Nicolai).

Pflugscharbein : Gestalt vollkommen. Breite 2''' , Länge 7—8''' (Nicolai).

Gaumenbeine : Pars palat. 4''' breit, 3''' lang, Pars nasalis $\frac{1}{4}$ ''' hoch. Foramina pterygopalat. sichtbar (Nicolai).

Muscheln : Länge jeder Muschel 3—4''' (Nicolai).

Unterkiefer : Am Ramus die vollkommenen For. alveolar., Linea obliqua interna sichtbar. Länge 21—23''' , Höhe 5—6''' (Nicolai). — Länge 22—24''' , Höhe am Kinn 6—7''' , Höhe vom Winkel bis zur Kronenspitze 9''' , geringste Höhe 5''' . Größte Länge des aufsteigenden Astes 9''' . Gelenkkopf und Kronenspitze sind 6—7''' von einander entfernt. Gelenkkopf von aussen nach innen 4''' dick. Kronenfortsatz ragt gegen 4''' über den Zahnhöhlenrand vor, der Gelenkkopf $1\frac{1}{2}$ —2''' (v. Ritgen).

Erster Halswirbel : Seitentheile 6—7''' lang, Querfortsatz $1\frac{1}{2}$ ''' (Nicolai). — Verknöcherung im Körper nach Orfila.

Zweiter Halswirbel : Körper ist mit dem Proc. odontoid. 3—4''' hoch, oben 4''' , unten 3''' breit. Seitentheile 7—8''' lang, Querfortsatz $1\frac{1}{2}$ ''' (Nicolai).

Die 5 letzten Halswirbel : Spuren der schiefen Fortsätze und der Dornfortsätze. Körper 2''' hoch, $3\frac{1}{2}$ —4''' breit. Seitentheile 7—8''' lang, Querfortsatz 2''' , Höhe der Seiten-

Kreuzbein : Körper des ersten Wirbels 3''' hoch, 1 1/2''' breit, der letzte 2''' hoch (Nicolai). — Oberster Rumpfkörper 4''' hoch, 7''' breit, unterster 2''' hoch und 1 1/2''' breit (v. Ritgen).

Steißbein : Im ersten Stück des Os coccygis Ossification nach Orfila.

Schlüsselbein : Länge 20'', vorn 3''' dick, außen hinten 2''' breit (Nicolai, v. Ritgen).

Schulterblatt : Processus coracoideus als eine kleine Erhabenheit sichtbar, 16''' lang, 11''' breit (Nicolai). Länge 19—20'', größte Breite 15'', größte Höhe am Acromion 6—7''. Gelenkfläche ist 3''' hoch, 1 1/2—2''' breit (v. Ritgen).

Oberarmbein : Oben eine Rinne für den Musculus biceps, unten, vorn und hinten eine Grube. Länge 20'', Dicke 4—5'', Breite unten 7—8'' (Nicolai, v. Ritgen). — Es beginnen die Ansätze zu verknöchern, nämlich zuerst unten (Meckel); dagegen soll nach v. Beclard das obere Ende eher verknöchern.

Ellenbogenbein : Anfang des Processus coronoideus. Länge 2'', oben von vorn nach hinten 4''' dick, mitten 3''' dick, unten 2—2 1/2''' dick (Nicolai). — Länge 2 1/2—2 3/4'', größte Dicke oben 6'', mitten 2 1/2'', unten 3'', geringste Dicke 1 1/2'' (v. Ritgen).

kleinen
1 1/2''' br
Mittelfin
fingers
(v. Ritg
Zwe
2'', des
3''' (Nicol
fingers 3
(v. Ritg
Nag
— Es m
Ringfing
3 1/8'', a
verknöch
Ers
Sieb
Angulus
sind am
Let
Bre
breit.
(Nicol
Oberste
5''' bre

kleinen Fingers 3^{'''}. Die ersten hinten 2^{'''} breit, vorn 1¹/₂^{'''} breit (Nicolai). — Vollständige Form, der des Mittelfingers 5¹/₂^{'''} lang, des Ringfingers 6⁵/₈^{'''}, des Zeigefingers 6¹/₂^{'''}, des Ohrfingers 5^{'''}, des Daumens 4^{'''} (v. Ritgen).

Zweite Reihe : Länge des Gliedes des kleinen Fingers 2^{'''}, des Mittelfingers 3¹/₂—4^{'''}, des Ring- und Zeigefingers 3^{'''} (Nicolai). — Der des Mittelfingers 4^{'''}, des Ringfingers 3⁷/₈^{'''}, des Zeigefingers 3³/₄^{'''}, des Ohrfingers 3^{'''} (v. Ritgen).

Nagelglieder : Gröfse wie im achten Monat (Nicolai). — Es misst das ganze Nagelglied am Daumen 3¹/₂^{'''}, am Ringfinger 3¹/₃^{'''}, am Mittelfinger 3¹/₄^{'''}, am Zeigefinger 3¹/₈^{'''}, am Ohrfinger 3^{'''}; hiervon ist aber noch 1¹/₄^{'''} unverknöchert (v. Ritgen).

Erste Rippe : Länge 10—11^{'''} (Nicolai).

Siebente Rippe : Länge 30—31^{'''}, vorn 2¹/₂^{'''} hoch, am Angulus 3^{'''}, Collum 2^{'''} hoch. Die 7., 8., 9., 10. Rippe sind am Angulus 3^{'''} hoch (Nicolai).

Letzte Rippe : Länge 9—10^{'''} (Nicolai).

Brustbein : Knochenkern im Körper 5^{'''} hoch, 3—4^{'''} breit. Im Körper 2 gröfsere und 2 kleinere Knochen (Nicolai). — Kern des Griffes 5^{'''} hoch, 3—4^{'''} breit. Oberste Abtheilung 3^{'''} hoch, 6^{'''} breit, zweite 2¹/₂^{'''} hoch, 5^{'''} breit, Schwerdtstück 4^{'''} lang und 1¹/₂—2^{'''} breit.

olai). Knochenstück 8''' lang, unten 4'', oben 5'''
(v. Ritgen). — Der aufsteigende Ast des Sitzbeins
an zu verknöchern (Orfila).

Schambein : Scham- und Sitzbein stehen am Arcus
einander ab. Eine flache Vertiefung als Pfanne sicht-
Größter Durchmesser 7'', absteigender Ast 3''' lang,
breit (Nicolai). — Länge 8'', Kopf misst $3\frac{1}{2}$ '''
oben nach unten, 3''' von vorn nach hinten, der Hals
und 2''' in den genannten Richtungen (v. Ritgen).
Der absteigende Ast des Schambeins fängt an zu ver-
hern (Orfila).

Oberschenkel : Länge $2\frac{3}{4}$ '', mitten 3''' dick, oben
'', unten 8–10''' (Nicolai). Länge des verknöcher-
Theiles 2''8'', Dicke oben 8'', unten $8\frac{1}{2}$ '', mitten 3'''
(v. Ritgen). Die Mitte des Knorpels, welcher das untere
des Femur bildet, zeigt einen erbsenförmigen Ver-
herungspunkt, der gewöhnlich bis in die Hälfte des
Monats des Uterinlebens knorpelig bleibt (Orfila).
Knochenkern bildet sich aus in der unteren Epiphyse
Oberschenkels nach Beclard, Ollivier, Mildner,
per, Kölliker und Hollstein.

4) Bei
3 Ta
5) Bei
11 Ta
6) Bei e
7) Bei
8) Bei e
21 Ta

Schi
und For
oben 7—
Länge 2
oberen
Ausnahm
(Köllik
Wac
dick (Ni
dick (v.
Fuß
viculare
Breite 3
Kahnbein
Sprungbe
neus und
cirten Kn

Bei einem Kinde von 9 Monaten und		
3 Tagen (sehr stark)	13	12
Bei einem Kinde von 10 Monaten und		
11 Tagen (sehr mager)	10	8
Bei einem Kinde von 11 Monaten	15	13
Bei einem Kinde von 1 Jahre	15	10
Bei einem Kinde von 1 Jahr 3 Monaten		
21 Tagen (sehr mager)	15	10

Schienbein : Oben nach innen gebogen, eine Rinne und Foramina nutricia, mitten dreieckig, Länge 2''3—4'', oben 7—8'', unten 5—6'', mitten 3'' dick (Nicolai). — Länge 2'', mitten 3'', oben 8'', unten 6¹/₂'' dick; in der oberen Epiphyse Anfang der Ossification (v. Ritgen). Ausnahmsweise in der oberen Epiphyse Verknöcherung (Kölliker).

Wadenbein : Länge 2''3—4'', oben 2¹/₂'', unten 3'' dick (Nicolai). — Oben 3'', unten 3¹/₃'', mitten 1¹/₂'' dick (v. Ritgen).

Fußwurzelknochen : Astragalus, Calcaneus und Os naviculare zeigen Ossification; Länge des Calcaneus 4'', Breite 3'' (Nicolai). — Ausnahmsweise verknöchern Kahnbein und Würfelbein, abgesehen von Fersenbein und Sprungbein, noch vor der Geburt (v. Ritgen). Calcaneus und Astragalus sind die einzigen zum Theil ossificirten Knochen des Tarsus (Orfila).

“(Nicolai). — Länge der 2. und 4. Zehe $2\frac{1}{2}'''$, der $1\frac{1}{2}'''$ (v. Ritgen).

Dritte Zehenglieder : Das Glied der grossen Zehe hat tlich seine Gestalt, die übrigen sind kleiner (Nicolai). Länge $4'''$, $2'''$, der 3. und 4. $1\frac{3}{4}'''$, $1\frac{1}{4}'''$, Breite $2\frac{1}{2}'''$, 2., 3. und 4. $1\frac{1}{2}'''$, der fünften $\frac{3}{4}'''$ (v. Ritgen).

Erstes Jahr.

Bei der Geburt sind noch unverknöchert alle Handzelknochen, die 5 kleinen Fußwurzelknochen, die letzten fsbeinstücke, die Epiphysen aller Röhrenknochen, hie da mit Ausnahme der einander zugewendeten von ur und Tibia, die Patella und die Sesambeine (Köl-er).

Keilbein besteht zur Zeit der Geburt noch aus 5 ge-nten Stücken. Was die Scheitelbeine anlangt, so ist vordere obere Winkel noch nicht entwickelt, und die urch entstehende Lücke trägt zur Bildung der grossen tanelle bei. Die kleinen Hörner des Zungenbeins ver-chern einige Zeit nach der Geburt. Kurz nach der urt im ersten Stück des Steifsbeins Verknöcherung. der Geburt sind die Enden des Oberarmbeins noch pelig. Zur Zeit der Geburt ist der Radius, mit Aus-

und di
aus 3
werden
kaum
versa.
nasalis
normal
man d
aus 2
physe,
interna
Bogen
berühr
fortsätz
gedeut
erkenn
gebilde
wirbel
im Ste
normal
Am Si
bein h
und in
Kopf
Radius

und die Incisura parietalis wird sichtbar. Keilbein besteht aus 3 Stücken, Schläfen- und Augenfläche der Ala magna werden deutlich, ebenso der Hamulus pterygoideus und eine kaum merkliche Hervorragung bedeutet die Spina transversa. Am Oberkiefer sind Juga alveolaria und die Spina nasalis anterior deutlich. Muscheln und Nasenbeine haben normale Gestalt und sind verknöchert. Am Jochbein sieht man das Foramen zygomaticum. Unterkiefer besteht noch aus 2 Stücken, sein Pr. condyloideus hat noch keine Epiphyse, ist rundlich und wie überknorpelt, Spina mentalis interna noch undeutlich. Der Atlas hat im vorderen Bogen einen runden Knochenkern, die übrigen Halswirbel berühren sich hinten und bilden die noch getheilten Dornfortsätze, schiefe Fortsätze durch kleine Gelenkflächen angedeutet. Die Querfortsätze der Rückenwirbel sind zu erkennen, dagegen ihre Dornfortsätze noch schwach ausgebildet. Die Querfortsätze und Dornfortsätze der Lendenwirbel noch knorpelig. Kreuzbein hat 3 For. sacr. anter., im Steißbein ist ein Knochenkern sichtbar. Darmbein hat normale Gestalt und seine Spina ant. super. u. infer. — Am Sitzbein ist die Spina ischiadica zu bemerken. Brustbein hat im Manubrium 3 Knochenkerne, im Körper 4 und im Pr. xyphoid. 1. — Am Oberarm sieht man weder Kopf noch Hals, ist aber dicker oben als sonst. Am Radius ist der Hals zu unterscheiden und unter diesem

en Flügel mit dem Körper des Keilbeins, am Sieb-
hat man Verknöcherung der Crista galli und der
na perpendicularis, die beiden Hälften des Unter-
s verwachsen und ist die Verwachungsstelle durch
pina mentalis angedeutet. Man sieht einen Knochen-
für den Processus coracoideus und hat Verknöcherung
sten Stück des Steißbeins kurz nach der Geburt.
er hat man einen Kern für das obere Ende des
nbeins und Verknöcherung des Os cuneiforme tertium.
n Ende des Jahres einen Knochenkern für den Kopf
Oberschenkelbeins und Verknöcherung im Os capita-
and Os hamatum (Hollstein).

Im Verlauf des ersten Jahres verwächst die Stirn-
aht über die Hälfte; an der Sutura sagittalis der
telbeine bemerkt man in einander greifende Knochen-
en und die strahlenförmige Faserung des Knochens
undeutlich. Hinterhauptsbein besteht aus 4 Stücken,
ein aus 3 Stücken und sein Foramen spinosum ganz
Knochenmasse umgeben, Ränder und Flächen der
magnae vollkommen. Am Schläfenbein sieht man
Foramen styloideum deutlich, Processus mastoideus
jedoch. Unterkiefer besteht jetzt aus einem Stück.
abeine, Jochbeine, Thränenbeine, Muscheln und Vomer
deutlich. Siebbein ist in der Augenhöhle mit der
na papyracea, sowie die Foramina ethmoidalia voll-

beine h
naht ve
Fontane
gegen d
Ein Kn
des Bru
und Kop
sich.
(Böcke

Stir
auch die
stein,
verschm
sich der
mastoide
aus 2 St
verbunde
Vereinig
des Os et
(Orfila
ten Jahr
coideus

eine hat sich das Planum semicirculare gebildet, Stirnhaut verwächst bis zum Ende des Jahres um die Hälfte, Fontanellen am Kopfe verkleinern sich und schliessen sich gegen den 9. und 13. Monat. Schläfenbein bildet 4 Stücke. Ein Knochenkern entsteht am schwerdtförmigen Fortsatze des Brustbeins und im Haken des Schulterblattes. Hals und Kopf am Oberschenkel bilden sich, Mittelstück krümmt sich. In der Kniescheibe entsteht ein Knochenkern (Böcker).

Zweites Jahr.

Stirnbeine sind mit einander verwachsen und somit auch die große Fontanelle geschwunden (Nicolai, Hollstein, Böcker). Schläfenbeine sind zu einem Stück verschmolzen (Nicolai, Orfila, Böcker), es erhebt sich der Proc. mastoideus, und nach innen ist die Incisura mastoidea deutlich (Nicolai). Hinterhauptsbein besteht aus 2 Stücken, der Pars basilaris und den zu einem Stück verbundenen Gelenk- und Hinterhauptstheilen (Nicolai). Vereinigung der Lamina cribrosa mit den Seitentheilen des Os ethmoideum, Verknöcherung der Cornua sphenoidalia (Orfila). Das Schulterblatt zeigt nach Verlauf des zweiten Jahres einen Ansatz, Epiphyse für den Processus coracoideus (Nicolai). Verknöcherung im Processus cora-

Epistropheus besteht aus den hinteren Bögen, Körper
Pr. odontoideus. Seitentheile hinten mit einander ver-
einigt, Pr. spinosus undeutlich (Nicolai); es bildet sich
ein Knochenkern zwischen dem Körper des Epistropheus
und dem Pr. odontoideus und auch die Verschmelzung
beider Kerne des Pr. odontoideus (Orfila). Von
den übrigen Halswirbeln haben der 3te, 4te und 5te Wir-
bel spitzzigige Pr. spinosi, der 6te und 7te Wirbel 1
paar Pr. spinosi. Sonst hat jeder Halswirbel Bogen-
körper, und ebenso Rücken- und Lendenwirbel (Ni-
colai). Man kann den Knochenpunkt isoliren, welcher
den Processus transversus des 7ten Halswirbels bildet und
markirt die Vereinigung der beiden Punkte des hinteren
Bogens jedes Wirbels (Orfila). Das Kreuzbein besteht
aus falschen, noch getrennten Wirbeln; die Seitentheile
verknöchern sich noch nicht (Nicolai), der 5te Wirbel wird
nicht gebildet (Hollstein). Ein Knochenkern im ersten
Lendenwirbel (Nicolai, Orfila). Darm-, Scham- und
Hüftbein berühren sich in der Pfanne (Nicolai, Böcker).
Am Kopf des Oberschenkels eine Epiphyse, am unteren
Ende bilden sich ebenfalls die Condyli und Gelenktheile
(Nicolai), ebenfalls am Kopf des Oberschenkels
Verknöchigung nach Orfila, Böcker. Die Tibia hat
eine Epiphyse für den Kopf und Gelenktheil (Nico-
laid Orfila und Böcker), unten ebenfalls einen starken

Ende kle
wurzelkn
knöchert
deutliche

Nach
haupts v
Zacken
mit dem
Dornfort
Verschm
beiden
Tubercu
Knochen
Verknöc
der Em
stein).
(Böcke
Böcke
seitigen

Von
treten

Ende kleine Ansätze (Nicola, Orfila). Von den Handwurzelknochen sind Kahn, Haken und Kopfbein verknöchert (Nicolai, Böcker), die übrigen zeigen un- deutliche Knochenpunkte (Nicolai).

Drittes Jahr.

Nach dem dritten Jahre sind die Theile des Hinter- haupts verwachsen und an den Kopfknochen bilden sich Zacken (Böcker). Der Processus odontoideus verwächst mit dem Körper des Epistropheus (Orfila, Böcker). Dornfortsätze der Wirbel verknöchern (Böcker). Die Verschmelzung der 3 Stücke, aus denen jeder der letzten beiden Sacralwirbel besteht, hat begonnen (Orfila). Tuberculum minus humeri verknöchert (Orfila); ein Knochenkern für die Höcker, kurz darauf beginnt die Verknöcherung des unteren Endes, und zwar zuerst die der Eminentia capitata, dann die der Trochlea (Holl- stein). Großer Trochanter des Oberschenkels verknöchert (Böcker). Kniescheibe verknöchert (Orfila, Hollstein, Böcker). Es verknöchern die keilförmigen und die drei- seitigen Knochen (Böcker).

Viertes Jahr.

Von der Zeit nach der Geburt bis zum vierten Jahre treten Knochenkerne auf für die Epiphyse aller Röhren-

ulnae, für die ersten Glieder der Finger zwischen
ten und 4ten Jahre, für die dritten Glieder im 4ten
ten Jahre (Hollstein). In diesem Jahre ist das
d 3te Os cuneiforme verknöchert (Orfila).

Fünftes Jahr.

scapulum verknöchert (Orfila, Hollstein, Böcker).
trapezoidale der Hand verknöchert (Böcker). Os
gigantum majus verknöchert (Hollstein, Orfila).
Verwachsung der Lamellen des zweiten Wirbels mit
Körper und die Bildung der Zellen des Os ethmoidale
(Orfila). Die Bogen der Brust-, Bauch- und obersten
Lenden ver wachsen mit dem Körper (Hollstein,
Böcker). Zuweilen ist es noch möglich, die 5 Stücke
des 5ten Sacralwirbels zu trennen (Orfila); der erste
des Kreuzbeins ist zuweilen nicht vor dem 5ten
Jahre fertig gebildet (Hollstein). Zacken der Kopf-
knochen greifen in einander; Brustbein besteht aus 5
Stücken (Böcker). Es entwickelt sich ein Knochen-
kern für den Condylus internus des Humerus (Hollstein).
Knochenkern für das Capitulum ulnae, ein Kern für das obere
Ende des Radius (Hollstein), Ansätze der Ulna und
des Radius ossificiren (Böcker). Knochenkern für die
Mittelfingerglieder im 4ten oder 5ten Jahre (Hollstein).

die Verk
An den
Knochen
knöchern
Zehen;
knorpelig

Das
(Böcke
(Orfila
im 7ten
knöchern
knorpelig
ischii und
der aufst
des Scha
mit Ausn

Zw
den Kno
das Os
Os pisifo
man eine

ie Verknöcherung am unteren Ende der Ulna (Orfila).
An den zweiten Fingergliedern erscheinen zuweilen die
Knochenkerne in diesem Jahre (Hollstein). Es ver-
knöchern die Fortsätze der ersten Phalangen der 4 letzten
Zehen; Os pisiforme, Os multangulum minus sind noch
knorpelig (Orfila).

Siebentes Jahr.

Das Keilbein verwächst im 7ten und 8ten Jahre
(Böcker). Condylus internus humeri ist verknöchert
(Orfila). Die zweiten Fingerglieder ossificiren zuweilen
im 7ten Jahre (Hollstein). Im Sitzbein entstehen Ver-
knöcherungspunkte (Böcker). Im 7ten Jahre dauert die
knorpelige Linie zwischen dem aufsteigenden Ast des Os
ischii und dem absteigenden des Schambeins fort (Orfila);
der aufsteigende Ast verbindet sich mit dem absteigenden
des Schambeins (Böcker). Alle Stücke des Os coccygis
mit Ausnahme des ersten bleiben knorpelig (Orfila).

Achtes Jahr.

Zwischen dem 7ten und 8ten Jahr sieht man deutlich
den Knochenkern im Olecranon (Orfila). Es verknöchert
das Os naviculare der Hand (Hollstein), zuweilen das
Os pisiforme (Hyrtl). Im oberen Ende des Radius findet
man einen Knochenkern (Orfila).

zwischen dem 8ten und 9ten Jahre bemerkt man die
Verknöcherung der beiden Punkte, welche das obere
Ende des Humerus bilden und außerdem Verknöcherung
des Os naviculare der Hand und der hinteren Epiphyse
des Calcaneus nach Orfila.

Zehntes Jahr.

Man findet einen Knochenkern für das Olecranon gegen das 10te
Jahr und ebenso im 2ten Stück des Steißbeins gegen
das 10te Jahr und ebenso im dritten Stück. Ein Knochen-
kern für das hintere Ende des Calcaneus in diesem Jahre
(Orfila).

Elftes Jahr.

Angaben fehlen.

Zwölftes Jahr.

Orfila findet einen Knochenpunkt am inneren Rande
des Foramen rochlea des Humerus. — Verknöcherung im Os pisi-
nach Gerlach, Hollstein, Hyrtl.

Dreizehntes Jahr.

zwischen dem 13ten und 14ten Jahre ist der kleine
Knochen an der Hand verknöchert (Orfila, Hollstein). Ver-

cation in
humeri z
A. Sch
Vom 6te
aus hyal
fläche l
Köllik
physen
Pubertät
thumspe

In
der Ext
die End
(Hollst
dahin m
im unter
des Kn
schmelz
(Orfi
des St
16ten
ein Kn
Körper

ation im Trochanter minor femoris und Condyl. externus
umeri zuweilen erst in diesem Jahre (Hollstein). Fr.
A. Schwegel bemerkt in Betreff der Bipubicalverbindung:
Vom 6ten bis 14ten Jahre verknöchert die Schichte, welche
aus hyalinem Knorpel besteht und zunächst an der Knochen-
fläche liegt, und verschmilzt mit dem Schambeine. — Nach
Kölliker kommt die Vereinigung der meisten der Epi-
physen und Fortsätze mit den Diaphysen zum Theil zur
Pubertätszeit, zum Theil gegen das Ende der Wachs-
thumsperiode zu Stande.

Fünfzehntes Jahr.

In diesem Jahre zuweilen ein zweiter Knochenkern in
der Extremitas sternalis claviculae und die Epiphysen für
die Enden der Dorn- und Querfortsätze der Wirbel deutlich
(Hollstein). Man bemerkt die Verschmelzung der bis
dahin noch trennbaren Sacralwirbel, einen Knochenpunkt
im unteren Winkel des Schulterblattes, die Verschmelzung
des Knochenpunktes im Pr. coracoideus, und die Ver-
schmelzung der beiden Knochenpunkte im Calcaneus
(Orfila). Ein Knochenkern für das 3te und 4te Stück
des Steißbeins (Hollstein). Zwischen dem 15ten und
16ten Jahre findet sich in der Spitze des Acromion
ein Knochenpunkt und der Pr. coracoideus ist mit dem
Körper des Knochens verschmolzen, und zwischen dem

Epiphysen für die Enden der Dorn- und Quer-
e der Wirbel erscheinen zuweilen in diesem Jahre
stein). Man sieht einen Knochenkern am Kopfe
n Fortsätzen der Rippen (Orfila). Die beiden
n Knochenkerne der Rippen beginnen erst zwischen
ten und 20ten Jahre zu verwachsen (Hollstein).
ten bis 16ten Jahre verknöchert ein Theil des hya-
eberzugsknorpels der an einander stoßenden Flächen
euz- und Darmbeins (Schwegel). Erst um das
s 18te Jahr beginnt die Verschmelzung der Kreuz-
bel unter einander, indem noch 14 Knochenkerne
eten (Hollstein).

Siebzehntes Jahr.

sind die Epiphysen an den Phalangen der Finger
er Zehen mit einander verschmolzen, auch findet
zwischen diesem und dem 18ten Jahre eine Epiphyse
hulterblatt (Orfila).

18ten bis 19ten, 20ten, 21ten, 25ten und 30ten
Jahre.

n 18ten Jahre bemerkt man die Epiphysenkerne
r Spitze der Pr. spinosi und transversi, sowie die

18ten
des For
rung de
(Hollst
Hinterh
zuweilen
die Extr
dem 18t
der Ep
unteren
und die
mit dem
ist das
Endstüc
knöcher
erfolgt
mit dem
dann au
det sich
Jahr hi
untere
der Ap
Knochen
an der
zwar be

8ten und 19ten Jahre bemerkt man die Verschmelzung des Fortsatzes der Ossa metatarsi (Orfila); Verknöcherung der Mittelhandknochen ist beendet um das 20te Jahr (Hollstein). Die Verwachsung des Keilbeins mit dem Hinterhauptsbeine erfolgt erst gegen das 20te Jahr hin, zuweilen im 18ten Jahre noch ein 2ter Knochenkern für die Extremitas sternalis claviculae (Hollstein). Zwischen dem 18ten bis 20ten Jahre bemerkt man die Verschmelzung der Epiphyse der Ossa metatarsi, die Vereinigung des unteren Endes des Femur mit dem Körper des Knochens und die Verschmelzung der beiden Enden des Humerus mit dem Körper des Knochens (Orfila). Im 18ten Jahre ist das untere Endstück und im 20ten Jahre das obere Endstück mit dem Körper vereinigt und somit die Verknöcherung des Oberarms vollendet; um das 20te Jahr erfolgt die Verschmelzung des unteren Endes der Ulna mit dem Mittelstück und ebenso beim Radius, bei welchem dann auch die Verknöcherung vollendet ist. Weiter vollendet sich die Verknöcherung der Fingerglieder um dieses Jahr hin (Hollstein). Im 21ten Jahre verschmilzt das untere Ende des Femur (Orfila); die Verschmelzung der Apophysen und Epiphysen mit der Diaphyse dieses Knochens ist nach dem 20ten Jahre vollendet und ebenso an der Tibia zwischen dem 18ten und 25ten Jahre und zwar bei letzterer unten früher als oben; weiter verknöchert

Die Verknöcherung vollständig beendigt ist. Verbindung zwischen dem dritten und zweiten Stück des Beckens um das 20te und 25te Jahr, zwischen dem vierten und ersten um das 25te bis zum 30ten Jahre. Am Schulterblatt kommen die Vereinigung der Epiphysen, besonders vom *Pr. carocoides*, um das 21—25te Jahr zu Ende (Hollstein). Vom 22—25ten Jahre ist es möglich, den Fortsatz des *Os coxarum* zu trennen. Zwischen dem 20ten und 25ten Jahre verschmelzen die obersten Enden der *Pr. transversi* und *spinosi* der Wirbel, ebenso die Epiphyse der Rippen, und das erste Stück des Beckens vereinigt sich mit den anderen Theilen. Im 30ten Jahr bilden sich epiphysäre Lamellen auf der *Superioriliaca ossis sacri*. Zwischen dem 25ten und 30ten Jahre verschmilzt der erste Sacralwirbel vollständig mit dem zweiten, die epiphysären Scheiben der Wirbel verschwinden (Orfila). Mit dem beendeten Wachsthum des Beckens in die Länge ist die knorpelige Verbindung der Epiphysen mit den Diaphysen der Knochen durch eine Verwachsung der früher getrennten Stücke ersetzt, am Schulterblatt, Hüftbeine und die einzelnen Beckenknochen verschmelzen völlig (Böcker).

gewöhnlich

Pfe

Kronna

Zitzenn

das 90.

Im

50. oder

spröder

Gewich

diesen

höcker

hervor

einsink

gelb od

die ein

dung.

nehmen

Folge

Zuweil

zwischen

einer I

da sie

schmäle

gewöhnlich gegen das 60. Jahr (Böcker).

Vom 70.—100. Jahr.

Pfeilnaht verwächst im Anfang der 70er Jahre, die Kronnaht um das 75.—76. Jahr, die Hinterhaupt- und Sitzennaht um das 80. Jahr, und die Schuppennaht gegen das 90.—100. Lebensjahr (Böcker).

Im Allgemeinen im Greisenalter, dessen Anfang das 50. oder 60. Jahr ist, werden die Knochen immer dünner, spröder und leichter, zuweilen bis auf den 4. Theil ihres Gewichtes. Die Schädelknochen und namentlich unter diesen die Scheitelbeine werden viel dünner, die Stirnhöcker und die Augenbrauenbogen treten immer mehr hervor, so daß die Glatze über der Nasenwurzel tiefer einsinkt und deutlicher wird. Mark der Knochen wird gelb oder gelbbräunlich, nimmt ab und ebenso die Diploë, die einzelnen Knochen werden eckig, verlieren ihre Rundung. Zwischenknorpel der Wirbel verknöchern zuweilen, nehmen aber gewöhnlich an Dicke und Höhe ab, und in Folge davon entsteht eine Verkürzung der Wirbelsäule. Zuweilen verknöchern auch noch die Verbindungsbänder zwischen den Wirbeln, und so fand man 3—9 Wirbel zu einer Knochenmasse vereinigt. Körper der Wirbel sind, da sie an ihrem vorderen Rande wie abgerieben, vorn schmaler als hinten. Schulterblätter sind dünner, und

derselben (Orfila).

Die Zähne.

r Abrundung des Ganzen und besserer Uebersicht
erst Einiges von der Entwicklung in zeitlicher Be-
. — Die Entwicklung des Zahnsäckchens (primi-
hnhfurche) der 20 Milchzähne fällt in sehr frühe
ad zwar in die 6. Woche. Das Auftreten der Pa-
für die vorderen Milchbackenzähne fällt in die
he, in die 8. Woche die der Eckzähne, in die 9.
Schneidezähne und in die 10. die der hinteren
ackenzähne, so daß um diese Zeit 20 Zahnkeime
len sind.

e eigentliche Bildung der Milchzähne beginnt in
Fötalmonate, gleich nach der gänzlichen Schließung
nsäckchens, und zwar nach Meckel in folgender
folge : ein Schneidezahn unten, derselbe oben,
Schneidezahn, vorderer Backzahn, Eckzahn, hin-
ackzahn, so daß im 7. Monat schon alle Milch-
n Ossification begriffen sind (Kölliker). — Bei
onen *) von 1" Länge findet man die primitive

Embryo von 1" Länge = ungefähr 8 Wochen alt

" " 2,5" " = " 3 Monat "

" " 5,5" " = " 4 Monat "

denen Zahnwälle, während von dem Boden der letzteren aus Scheidewände zwischen den einzelnen Papillen entstehen. Auf diese Weise kommt es zur Bildung der Zahnsäckchen, welche jedoch bei 3'' langen Embryonen noch offen gegen die Mundhöhle sind. Aus diesen Oeffnungen sieht man um diese Zeit die Zahnpapillen noch etwas hervorstehen. Erst bei Embryonen von 5,5'' Länge findet man die Zahnsäckchen gegen die Mundhöhle, in Folge einer Verwachsung der freien Enden beider Zahnwälle, abgeschlossen (Gerlach).

Vorbereitungen zur Zahnentwicklung bemerkt man schon zu Ende des 2. Monats (Valentin). Im 4. Monat erscheinen im Ober- und Unterkiefer die Zahnsäckchen (Scanzoni). Die Bildung und Entwicklung der Zähne fällt in sehr frühe Periode des Fötallebens, der Durchbruch erfolgt successiv und in einer bestimmten Reihenfolge, aber das Alter, in welchem die einzelnen Zähne sichtbar werden, ist nach der Individualität verschieden (Hollstein). Erste Entwicklung der Zähne fällt in sehr frühe Periode des Fötallebens, die eigentliche Bildung der Milchzähne (der Zahnsäckchen) beginnt mit dem 5. Monat. In jeder Kieferhälfte verknöchern zuerst die Schneidezähne, dann die 2 vordersten Backenzähne und dann der Eckzahn. Bis zum Durchbruch liegen die Zähne in ihren Säckchen und diese verschlossen in den Alveolen (Bruck).

bleibenden Zähne entwickeln sich genau in der Weise, wie die Milchzähne. Ihre *Ossification* beginnt etwas vor der Geburt in den ersten grossen Backschneidet, schreitet im 1., 2. und 3. Jahre auf die Schneideeckzähne und kleinen Backzähne fort, und ergreift endlich auch die zweiten grossen Backzähne, so dass im 7. Jahre zu gleicher Zeit 48 Zähne in beiden Kieferknochen enthalten sind, nämlich 20 Milchzähne und alle bleibenden, mit Ausnahme der Weisheitszähne (Köl liker). Der Durchbruch der Milchzähne geschieht in folgender Reihenfolge: Innere Schneidezähne des Unterkiefers im 6ten Monat, innere Schneidezähne des Oberkiefers 7 Wochen später, äussere Schneidezähne im 7—9ten Monat, die des Unterkiefers zuerst, vordere Backzähne im 14ten Monat, die des Unterkiefers zuerst, Hundszähne im 16—20ten Monat, zweite Backzähne zwischen 20ten und 30ten Monat (Köl liker).

Allgemeinen kommen die ersten Zähne zwischen 6 und 8. Monat zum Vorschein, und zwar zuerst die unteren, dann die oberen mittleren Schneidezähne, zuweilen umgekehrt. Vier oder acht Wochen später brechen die äusseren Schneidezähne durch, zuweilen auch später, oder früher, obgleich ziemlich oft Kinder mit Zähnen in die Welt gekommen sind. Ebenso können sie auch früher oder erst später erscheinen. Lanzoni sah ein

3. Jah
zum
weiter
vielen
(Orf
I
monat
das m
7. Mon
bald b
bald d
komm
2. Jah
sten z
diese
bruch
Zähne
A
des er
des 3
Ausna
Schne
sich in
den gl

3. Jahres sind in jedem Kiefer 10 Milchzähne, die bis zum 6—7. Jahre, abgesehen von Abnutzung, sich nicht weiter verändern. Diese Abnutzung ist jedoch, da sie vielen Veränderungen unterworfen, wenig zu verwerthen (O r f i l a).

Der Durchbruch beginnt gewöhnlich vom 6—7. Lebensmonat und dauert bis zum 2. Jahre, zuerst erscheinen das mittlere Paar der unteren Schneidezähne im 6. oder 7. Monate, nach einigen Wochen das der oberen Kinnlade; bald brechen die äusseren Schneidezähne, bald die oberen, bald die unteren zuerst hervor; zu Ende des ersten Jahres kommt der erste Backenzahn hervor, in der Mitte des 2. Jahres der Eck- und Augenzahn, gewöhnlich die untersten zuerst, und nach kürzerer oder längerer Zeit endigt diese erste Periode im 6—7. Lebensjahre mit dem Durchbruch des 2. Backenzahnes. Die Säckchen der neuen Zähne sind schon vorgebildet (B r u c k).

Anfang des Durchbruchs der Zähne in der 2. Hälfte des ersten Lebensjahres. Ende des 2. oder in der Hälfte des 3. Lebensjahres sind die 20 Milchzähne vorhanden. Ausnahmsweise werden Kinder mit durchgebrochenen Schneidezähnen geboren. Die Anlage der 2. Zähne findet sich in früher Fötalzeit. Die hintersten Backenzähne werden gleich als bleibende angelegt (V a l e n t i n).

nachher brechen die äulseren Schneidezähne (bald oberen, bald die unteren zuerst) durch; zu Ende des 1. Jahres kommt der erste Backenzahn hervor, in der Mitte des zweiten Jahres der Eckzahn (gewöhnlich die oberen zuerst) und mit dem Durchbrechen des 2. Backenzahns endet das erste Zahnen. Es sind 20 Milchzähne vorhanden (Böcker).

Milchzähne sind viel kleiner als die bleibenden, haben dünneren Schmelz, sind von mehr bläulicher Farbe und viel schwächer (Bruck).

Das Hervorbrechen *der bleibenden Zähne* geschieht in der Ordnung: Erster großer Backenzahn im 7. Jahr, erster Schneidezahn im 8. Jahr, seitlicher Schneidezahn im 9. Jahr, erster kleiner Backenzahn im 10. Jahr, zweiter großer Backenzahn im 11. Jahr, Eckzahn im 12. Jahr, dritter großer Backenzahn im 13. Jahr, dritter Backenzahn zwischen dem 17. und 19. Jahr (Kölliker).

Manchmal geht der Durchbruch der Augenzähne dem ersten und zweiten Backenzahns vorher. Zwischen dem 18. und 25. Jahr oder zu einer unbestimmten Zeit brechen die letzten dicken Backenzähne. Sonst wie Kölliker (Orfila).

Im 7. Lebensjahre treten die bleibenden inneren unteren Schneidezähne kurz nach einander hervor und mehrere Monate später die inneren oberen, im 8. Lebensjahre

Keim
hatte,
Schnei
Monat
die äu
erst)
Backe
Mit d
jahre
zahn
30. Ja
B
wände
Milch
Wurz
noch
bleibe
länge
Mich
ausfal
I
imme
organ
des 6
begin

Beim sich im 5. Monate der Schwangerschaft gebildet hatte, durchbricht, treten die beiden inneren unteren Schneidezähne kurz nach einander hervor, und mehrere Monate später die inneren oberen; im 8. Jahre kommen die äußeren Schneidezähne (gewöhnlich die unteren zuerst) zum Vorschein; dann im 9. Jahre die 2 vorderen Backenzähne und erst im 12. oder 13. Jahre die Eckzähne. Mit dem Ausbruche des 4. Backenzahns in den Pubertätsjahren ist die 2. Zahnperiode beendet, denn der 5. Backenzahn (der Weisheitszahn) erscheint zwischen dem 20. und 30. Jahr (Böcker).

Beim Zahnwechsel werden die knöchernen Scheidewände, welche die Alveolen der bleibenden von denen der Milchzähne trennen, resorbirt, und zugleich schwinden die Wurzeln der Letzteren von unten her, in Folge eines noch nicht genau ermittelten Vorganges. So kommen die bleibenden Zähne, deren Wurzeln mittlerweile sich verlängern, gerade unter die lose gewordenen Kronen der Milchzähne, die endlich, wenn sie noch mehr hervortreten, ausfallen und ihnen den Platz einräumen (Kölliker).

Die Erneuerung der ersten Zähne erfolgt jedoch nicht immer in bestimmter Reihenfolge und Zeit, sondern diese organische Thätigkeit kann zu früh und schon zur Hälfte des 6. Jahres, sowie auch zu spät und erst im 8. Jahre beginnen. Im letzteren Falle endigt sie dann auch später,

Orfila sah selbst bei einem kleinen Mädchen, kaum
alt, fast gleichzeitig die oberen mittleren Schneide-
zähne und die Augenzähne erscheinen. Man kennt sonst kein
Beispiel mehr davon, obgleich diese Zähne nach den letzten
Backenzähnen diesen Anomalien am meisten unter-
worfen sind. Beim Erscheinen der Zähne hat die Krone
ihre völlige Grösse, die Wurzel hat jedoch noch länger
zu dicker zu werden (Orfila).
Manchmal eine dritte Dentition für einzelne ausge-
fallene Zähne (Kölliker).
Zur Zeit der Geburt ist der Process. coronoideus und
der Winkel des Unterkiefers noch kaum vorhanden. Diese
Verhältnisse, wie überhaupt die Kiefer im Allgemeinen,
ändern sich dann immer mehr aus (Orfila, Böcker).
Nehmen die Kiefer während der Entwicklung der
merkwürdige Veränderungen durch, auf die auch
J. Hunter die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Sie
setzen nämlich unmittelbar vor die Proc. coronoidei be-
stimmte neue Masse anzusetzen. Es sitzen nämlich die
neuen Milchbackenzähne nach ihrem Hervorbrechen un-
mittelbar vor diesen Fortsätzen, stehen jedoch im 7. Jahr
noch ziemlich weit von denselben. Das Zurücktreteten des
Process. coronoideus ist nur scheinbar, und wird dadurch
erklärt, dafs, während derselbe an seinem vorderen Rande
Resorption beständig Masse verliert, solche an seiner

Man hat beobachtet, daß die Zähne bis zum 75. Jahre und wohl noch länger ihre Weisse, Festigkeit und Vollständigkeit erhalten haben (Böcker).

Die Ursache des normalen Ausfallens der Zähne ist vielleicht die Ausfüllung der Pulpahöhle mit einer Art unregelmässigen Zahnbeins und Obliteration. In einzelnen Fällen findet man nach Tomes die Wurzeln im Alter ganz durchsichtig, wie Horn. Die Zähne werden im Alter dichter (Kölliker).

Abnutzung und Ausfallen der Zähne, welche im ersten Augenblick nicht unwesentlich zur Bestimmung des Alters erscheinen möchten, bieten aus mannigfachen Gründen keinen sicheren Anhaltspunkt dar.



Man hat beobachtet, daß die Zähne bis zum 7
und wohl noch länger ihre Weisheit, Festigkeit und
Ständigkeit erhalten haben (Böcker).

Die Ursache des normalen Ausfalls der Zähne
vielleicht die Auflösung der Epithelide mit ein
unregelmäßigen Nahrungsmitteln und Obstruktion. In ein
Fällen findet man nach Tornes die Zähne in
ganz durchsichtig, wie Horn. Die Zähne werden in
dichter (Kalk) (Kalk).

Abnutzung und Ausfall der Zähne, welche in
Augenblick nicht unwesentlich zur Bestimmung der
erscheinen möchten, bieten aus mannigfachen
keinen sicheren Anhaltspunkt dar.

[Faint, illegible text, possibly a continuation of the previous paragraph or a new section.]

[Faint, illegible text, possibly a continuation of the previous paragraph or a new section.]

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

Samstag, den 23. Juni 1860,

Morgens 10 Uhr

in der kleinen Aula der Universität

öffentlich vertheidigen wird

E m i l S a m e s

aus Gießen.

Gießen, 1860.

Druck von Wilhelm Keller.

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

Samstag, den 23. Juni 1860

Morgens 10 Uhr

in der kleinen Aula der Universität

öffentlich vorbedigen wird

Emil Sames

aus Gießen

Gießen, 1860.

Druck von Wilhelm Keller

I.

Flamant's Methode der Wendung auf den Kopf ist nicht zu empfehlen.

II.

Zur Radicalheilung einkammeriger Ovarialcysten ist die Injection der Exstirpation vorzuziehen.

III.

Bei Bestimmung des Lebensalters der Menschen aus Merkmalen am Skelett sind die Zähne unzuverlässig.


IV.

Die innerliche Darreichung der Adstringentien und Balsamica bei Blennorrhoea urethralis ist unnöthig.

die Bedeutung der Pneumonie oder der
culose hat.

I.

Flannant's Methode der Wendung auf
Kopf ist nicht zu empfehlen



II.

Zur Radicalheilung einkammeriger Ovariale
ist die Injection der Exsorption vorzuziehen

III.

Bei Bestimmung des Lebensalters der Mens
aus Merkmalen am Skelett sind die Zähne u
verlässig.

IV.

Die innerliche Darreichung der Abstrungen
und Balsamice bei Blennorrhoea urethralis ist
nötig.

Sames, Emil

Über die Hauptmerkmale an den Knochen des Menschen, die einen Rückschluß
auf das muthmaßliche Lebensalter erlauben

1860

Diss.med. 14-26

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10855385-1